

4. *Hemiptera från Kafferlandet.* — Hr Studeranden C. STÅL hade inlemnat följande fortsättning af sina beskrifningar öfver de af Hr J. A. WAHLBERG hemförda Hemiptera.

ANISOPS (SPIN.).

1. *A. natalensis*: capite albido, in mare valde carinato-producto; thorace albido, macula basali fuscescente; scutello abdominisque dorso dilute fulvescentibus; hemelytris albidis, diaphanis; abdomine supra apicem versus nigrovario, subtus nigro. Long. 8, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
2. *A. perpulcher*: capite thoraceque albidis, illo basi et apicem versus lutescente, hoc longitudinaliter subimpresso, macula apicali parva, lutescente; scutello miniato, basi utrimque macula nigricante; hemelytris diaphanis; abdomine supra dilute flavotestaceo, basin versus nigricans, apicem versus parce nigrovario, subtus nigro. Long. 7, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
3. *A. apicalis*: flavoalbidus; abdomine supra apicem versus nigrovario, subtus nigro. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

NOTONECTA (LIN.).

1. *N. sobria*: flavoalbida; thorace scutelloque basi fuscescentibus; hemelytris albidis, macula magna apicem versus fusca; abdomine nigricante. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

PLOA (STEPH.)

1. *P. pullula*: albida, fortiter punctata; capite linea longitudinali media lutescente; sutura, clavi corioque posterius brunneopunctatis; abdomine subtus nigrofusco. Long. 2, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

PLATYPLEURA (AM. & SERV.).

1. *P. Wahlbergi*: *P. stridulæ* valde affinis; differt tantum margine apicali hemelytrorum alarumque dimidio angustiore, illorum fuscescente-maculato, harum fusco. Long. 20, lat. 10 millim. — Ad Rondebosch.

OXYPLEURA (AM. & SERV.).

1. *O. sobrina*: dilute olivacea; vertice nigro, flavomaculato, basi utrimque flavo; thorace utrimque rotundatodilatato, incisuris nigro-fuscis; scutello maculis 6 basalibus, triangularibus, quarum 2 mediis majoribus, maculam rufotestaceam includentibus, posterius albido-mucoreo, albido-pilosu; hemelytris abdomine duplo longioribus, nervis testaceis, apicem versus fuscis, ante medium parce breviter albido-penicillatis, nervo transverso tertio pone nervum transversum secundum cum nervo longitudinali confluente; abdomine supra nigro, segmentis apice flavotestaceo-marginatis. Long. 22, lat. 12 millim. — In terra Natalensi.

2. *O. patruelis*: præcedenti valde affinis; non differt nisi thorace utrimque angulato-dilatato, hemelytris apice minus late rotundatis nervo que tertio transversali mox ante nervum transversalem secundum cum nervo longitudinali confluente. Long. 20, lat. 11 millim. — In terra Natalensi.

CICADA (LIN.).

1. *C. Cereris*: statura omnino *C. simplicis*, cui etiam colore omnino similis, sed duplo major; dilute virescens; hemelytris abdomine dimidio longioribus, hyalinis, nervis virescentibus; abdomine subtus flavotestaceo. Long. 17, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
2. *C. fusconervosa*: flavescentes; fronte medio, vertice, thorace, linea media flava excepta, scutello, lineis 2 mediis marginibusque lateralibus flavis exceptis, dorsoque abdominis nigris; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, sordide hyalinis, nervis costaque flavis, illis pone medium fuscocinctis; segmentis ventralibus macula media nigra. Long. 15, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
3. *C. pulchella*: flavotestacea; incisuris thoracis, maculis 3 magnis triangularibus scutelli, abdomine supra nigrofuscis; hemelytris abdomine plus dimidio longioribus, hyalinis, nervis flavis, transversis sanguineis. Long. 10, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
4. *C. abdominalis*: flavoalbida, pedibus obscurioribus; vertice, thorace scutelloque, interdum etiam maculis basalibus dorsi abdominis, nigricantibus; hemelytris abdomine nonnihil vel vix dimidio longioribus, nervis fuscescentibus, costa flavoalbida. Long. 12, lat. 5 milim. — In tractibus fluvii Limpopo.
5. *C. nigricans*: supra nigricans, subtus flavotestacea; maculis thoracis ferrugineis; hemelytris abdomine vix dimidio longioribus, subsordide hyalinis, nervis fuscis; pedibus fuscescentibus. Long. 13, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Gariep.
6. *C. luctuosa*: testacea, subtus flavotestacea; fronte medio, vertice, incisuris thoracis, scutello, marginibus lateralibus exceptis, nigricantibus; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, fuscescente hyalinis, nervis fuscis, transversis fuscocinctis. Long. 17, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
7. *C. longula*: elongata, flavotestacea; vertice, thorace scutelloque nigricantibus, horum marginibus lateralibus flavotestaceis; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, hyalinis; abdomine supra plus minus nigricante, incisuris flavotestaceis. Long. 13, lat. 3½ millim. — In tractibus fluvii Gariep.
8. *C. elongata*: elongata, dilute virescens; ocellis valde globosis, dilute rufotestaceis; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, hyalinis, nervis flavoviridibus; alis basi ipsa dilute rufotestaceis. Long. 12, lat. 3½ millim. — In tractibus fluvii Gariep.

HYPSELOMETOPUM (STÅL).

(loc. cit. p. 264).

1. *H. sumtuosum*: sordide flavotestaceum; hemelytris ochraceis, nigromaculatis, margini costali flavo nigroque vario; alis sanguineis,

apice nigrofuscis; abdominis margine nigromaculato; pedibus rufoserrugineis, intus obscurioribus. Long. 16, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.

SIMOTETTIX (STÅL).

(loc. cit. p. 264).

1. *S. Wahlbergi*: flavotestacea; thorace utrimque fusco; hemelytris abdomine duplo fere longioribus, vitreis, nervis dilute flavotestaceis, nervo suturali, macula stigmatical et macula oblonga suturali, apicali, fuscis; femoribus fuscopunctatis; tibiis anticis fuscis, basi et apice dilutioribus, posterioribus flavovirescentibus, intermediis extus longitudinaliter nigropunctatis. Long. cum hem. 12, lat. 3 millim. — Ad Boschjesmans Rand.

PSEUDOPHANA (BURM.).

1. *P. vinula*: dilute flavotestacea; capite valde cornuto, cornu thorace vix duplo longiore, fronte lutescente, flavoviridi-carinato; thoracis carina media virescente; hemelytris abdomine dimidio fere longioribus, albido-hyalinis, nervis apicem versus valde reticulatis, macula stigmatical fuscescente. Long. c. hem. 12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
2. *P. caffra*: sordide flavotestacea; capite cornuto, cornu verticis longitudine; fronte fulvescente, virescentecarinata; hemelytris abdomine vix dimidio longioribus, hyalinis, macula oblonga stigmatical nervisque apicis transversis fuscis. Long. c. hem. 8, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
3. *P. apicemaculata*: sordide flavotestacea; capite ante oculos triangulariter producto; hemelytris abdomine vix dimidio longioribus, flavotestaceo-hyalinis, apice fuscomaculatis. Long. c. hem. 8, lat. 3 millim. — Ad Boschjesmans Rand.
4. *P. natalensis*: sordide flavotestacea; capite ante oculos triangulariter producto, latitudine intraoculari ter longiore; hemelytris abdomine vix duplo longioribus, albido-hyalinis, nervis apicem versus maculaque stigmatical fuscis, femoribus fuscomaculatis. Long. 10, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
5. *P. casta*: dilute rufotestacea; capite ante oculos triangulariter producto, latitudine intraoculari vix ter longiore; fronte virescentecarinato; hemelytris abdomine vix duplo longioribus, albido-hyalinis, nervis dilute virescentibus; tibiis dilute virescentibus. Long. 13. lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
6. *P. Cereris*: dilute flavoviridis; capite ante oculos triangulariter producto, latitudine intraoculari vix ter longiore; capitis thoracisque carinis laete viridibus, fronte inter carinas dilute fulvescente; hemelytris abdomine duplo fere longioribus, albido-hyalinis, nervis dilute virescentibus; tarsis anterioribus dilute flavotestaceis. Long. 11—13, lat. 3— $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

STRONGYLODEMAS (STÅL).

(loc. cit. p. 265).

1. *S. circularis*: fuscotestaceus; hemelytris sordide albidis, nervis valde elevatis, parce fuscoirroratis; pedibus sordide flavotestaceis. Long. 5, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

CIXIUS (LATR.).

1. Thorace tricarinato.

1. *C. setinervis*: fuscotestaceus; hemelytris sordide albido-hyalinis, nervis fuscogranulatis, setulosis; verticis marginibus valde elevatis. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Ad Rondebosch.
2. *C. albipennis*: flavoalbidus; hemelytris albis, macula parva apicali fusca. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
3. *C. variegatus*: flavoalbidus; fronte fusca, fasciis 2 maculisque marginis albidis; vertice medio fuscofasciato, apice longitudinaliter quadrilineato; thorace fusco-bifasciato; hemelytris dilute fusconebulosis, nervo costali fuscomaculato; pedibus dilute fuscomaculatis. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

2. Thorace quinquecarinato.

4. *C. Hottentottus*: fuscus; hemelytris sordide albido-hyalinis, fascia media maculaque stigmaticalii fuscis, nervis fuscogranulatis, setulosis. Long. 7, lat. $2\frac{1}{3}$ millim. — In tractibus fluvii Gariep.
5. *C. natalensis*: nigricans; hemelytris albido-hyalinis, nervis flavotestaceis, fuscopunctatis, macula stigmaticalii fusca. Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
6. *C. caffer*: fuscotestaceus; hemelytris albido-hyalinis, medio anguste fuscobifasciatis, nervis pilosulis, transversis fuscoindutis. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
7. *C. fasciolatus*: dilute flavescens; hemelytris vinaceohyalinis, fasciis 2 et maculis apicalibus fuscis, nervis pilosulis, albidoundulatis. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
8. *C. fuscipennis*: dilute flavotestaceus; hemelytris fuscis, pilosulis, basi dilute flavotestaceis. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
9. *C. moestus*: nigrofuscus; hemelytris fuscopellucidis, glabris; pedibus carinisque frontis sordide flavotestaceis. Long. 6, lat. $2\frac{1}{3}$ millim. — In terra Natalensi.

EMBOLOPHORA (STÅL).

(loc. cit. p. 265).

1. *E. monoceros*: dilute flavotestacea, hemelytris albido-hyalinis, nervis apice fuscis. Long. 4, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

DELPHAX (FABR.).

1. *D. vitticollis*: nigrofusca; vertice thoraceque vitta media flava; hemelytris abdomine duplo sere longioribus, fuscescentibus, margine exteriore late albido-hyalinis; pedibus sordide flavoalbidis. Long. 3, lat. $\frac{3}{4}$ millim. — Ad Rondebosch.
2. *D. lugens*: nigrofusca; hemelytris fuscobrunnescentibus, pedibus fuscotestaceis, tibiis dilutioribus. Long. 4, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

RHINOTETTIX (STÅL).

(loc. cit. p. 265).

1. *R. fuscipennis*: fuscotestaceus; capitis cornu fronteque nigris, hac apice albida; hemelytris fuscis; pedibus dilute flavescentibus. Long. 4, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

AMBLYCOTIS (STÅL).

(loc. cit. p. 265).

1. *A. laticeps*: sordide flavoalbida; hemelytris albidis, hyalinis, maculis 2 parvis disci fuscis, nervis fuscopunctatis, apicem versus fuscescentibus. Long. 4, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

HAPALOMELUS (STÅL).

(loc. cit. p. 265).

1. *H. flavipes*: nigricans; antennarum art. 1 fuscotestaceo, 2 fusco; hemelytris abdomine duplo longioribus, albido-hyalinis, pone medium vitta lata suturali, fusca, ramulos 2 emittente; pedibus dilute flavescentibus, tibiis tarsisque intermediis fuscescentibus. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim — In terra Natalensi.

TROPIDOCEPHALA (STÅL).

(loc. cit. p. 266).

1. *T. flaviceps*: capite thoraceque flavis; hemelytris puberulis, fuscis, nervis albido-granulatis, margine exteriore pone medium maculis oblongis albido-hyalinis; abdomine fusco; pedibus sordide flavoalbidis. Long. 3, lat. 1 millim — In terra Natalensi.

DERBE (FABR.).

1. *D. Wahlbergi*: flavotestacea; capite prothoraceque sordide albidis; hemelytris albidis, margini exteriore parce fuscomaculatis, nervis dilute fuscescentibus. Long. 12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
2. *D. natalicola*: testacea; verticis carinis altis, fuscomaculatis; hemelytris sordide albido-hyalinis, apicem versus obsolete fuscovariis,

nervis utrimque fuscopunctatis. Long. 6, lat. $1\frac{1}{4}$ millim. — In terra Natalensi.

3. *D. lanius*: miniata, subnitida; hemelytris flavotestaceo-hyalinis, margine costali miniatescente; femoribus diuite miniatis, tibiis anticis fuscescentibus. Long. 10, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

ISSUS (FABR.).

1. *J. compressus*: compressus, dilute fuscotestaceus; frontis lateribus fuscomaculatis; hemelytris fuscescentibus, marginibus albidohyalino-maculatis. Long. 4, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

COLOBESTHES (AM. & SERV.)

1. *C. Walkeri*: flavoalbidus; hemelytris margine costali pone medium, apicali suturalique apicem versus lutescentibus, macula nigra minuta ad suturam ornatis. Long. 5, Exp. al. 23 millim. — Ad Boschjesmans Rand.
2. *C. bellulus*: dilute virescens; fronte testacea; hemelytris ad suturam granulatis, margine imo apicali inter nervos fuscescente; pedibus flavotestaceis. Long. 4, Exp. al. 13 millim. — In terra Natalensi.

ACROMETOPUM (STÅL).

(loc. cit. p. 266.)

1. *A. costatipenne*: sordide flavotestaceum; fronte nigropunctata; vertice medio basique maculis 2 nigris; thorace utrimque fuscescente; hemelytris remote nigropunctatis; pedibus fuscopunctatis, femoribus anterioribus piceis. Long. 8, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

PHALÆNOMORPHA (AM. & SERV.).

1. *P. mira*: sordide flavotestacea; fronte apice fuscopunctata, utrimque punctis nonnullis fuscis serie positis, hemelytris abdomine duplo longioribus, angulis humeralibus rotundato-productis, parce fusco-variis, disco lineis 2 curvatis, anteriore subtransversa. altera sublongitudinali, apicem versus fascia angusta obliqua, infuscata. Long. 8, lat. $3\frac{1}{2}$ millim — In tractibus fluvii Limpopo.

RICANIA (GERM.).

1. *R. zonata*: fuscotestacea; fronte pedibusque flavotestaceis, his fusco-maculatis; hemelytris nigrofuscis, fascia albida, apicem versus macula nigra. Long. $3\frac{1}{2}$, Exp. al. 13 millim. — In terra Natalensi.

2. *R. lugens*: fuscotestacea; hemelytris nigrofuscis, opacis, margini apicali fasciaque angusta media, subnitidis; pedibus flavotestaceis. Long. 4, Exp. al. 12 millim. — In terra Natalensi.

CYSTINGOCEPHALA (STÅL).

(loc. cit. p. 266).

1. *C. margine-lineata*: flavotestacea; genis fuscolineatis; hemelytris obscurius vinaceohyalinis, maculis minutis fuscis parce sparsis, limbo antico subtransversim oblique fuscolineato. Long. 4. Exp. al. 12 millim. — In terra Natalensi. — E. Sierra Leona a D. Afzelio etiam reportata.

CENTROTUS (FABR.).

1. *C. validicornis*: nigrofuscus, granosulus, parce griseosericeus; thorace posterius utrimque linea albida, cornubus lateralibus validis, latis, parallelis, depressis, apice bimarginatis, postico curvato, compresso, supra subdilatato; tibiis tarsisque testaceis. Long. 10, lat. 3 millim. — In Terra Natalensi.
2. *C. bilineatus*: fuscoferrugineus, granulosus; thorace posterius utrimque linea albida, cornubus lateralibus validis, subsursum productis, apicem versus convexis, ampliatis, dein subito apice spinosis, postico a basi sursum producto, dein subito rectangulariter curvato et recto; hemelytris ferrugineis, subhyalinis. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
3. *C. spinicornis*: nigricans, lutescente sericeus; thorace postice utrimque linea alba, utrimque spina armato, cornu postico gracili, basi subcurvato, dein subrecto; hemelytris fuscohyalinis. Long. 6, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
4. *C. 4-punctatus*: niger; thorace postice scutelloque basi utrimque macula alba, illo utrimque spinoso, cornu postico subrecto; hemelytris fuscohyalinis, costa obscuriore. Long 6, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

RHINAULAX (AM. & SERV.).

1. *R. lugens*: nigra, hemelytris nigroferrugineis, lutescente-sericeis; abdomine sanguineo. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi

MONECPHORA (AM. & SERV.).

1. *M. fuscicollis*: nigra; fronte, vertice utrimque ante oculos, lateribus fasciaque thoracis, hemelytris, abdomine, basi nigro excepto, pedibusque rubris. Long. 10, lat. 4 millim. — In terra Natalensi

Variat fronte, abdomine tibiisque nigricantibus.

2. *M. rubida*: rubra; lineis frontis, vertice medio, thorace antice, limbo apicali hemelytrorum, pectore, abdomine pedibusque nigricantibus. Long. 10, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
3. *M. postica*: nigra; hemelytris, apice nigro excepto, pectoreque postico rubris. Long. 10, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
4. *M. funebris*: nigra; linea longitudinali humerali hemelytrorum interdum obsoleta, pectore postico, vagina pedibusque rubris. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
5. *M. rubella*: flavotestacea; hemelytris rufescens; abdomine, ano flavotestaceo excepto, tibiisque anterioribus nigrofuscis. Long. 6, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
6. *M. vidua*: sordide flavotestacea; hemelytris nigrofuscis, humeris limboque anteriore interdum obsolete rufescens; abdomine nigro, ano femoribusque rufescens, tibiis tarsisque nigris. Long. 6, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

APHROPHORA (GERM.)

1. *A. africana*: sordide flavotestacea, cum hemelytris dense punctata; his maculis 2 majoribus costalibus, semicircularibus, albidopellucidis, intus fuscocinctis; abdomine supra utrumque sanguineo. Long. 5½, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

PTYELUS (LEP. & SERV.).

1. *P. Linnei*: subsordide albidus; capite maculis 4 minutis basalibus, nigris; thorace apice lutescente, maculis 2 minutis fuscis; hemelytris griseovariis, maculis minutis nigrofuscis parce sparsis, linea longitudinali basali ante medium abbreviata, lutea, margine apicali anguste nigro; macula apiceque tibiarum tarsisque nigris. Long. 25, lat. 10 millim. — In terra Natalensi.
2. *P. Fabricii*: grisescens; capite thoraceque basi maculis 4, hoc etiam ante medium maculis 2 minutis, nigris; hemelytris albidoundulatis, maculis 2 majoribus costalibus, albidis; annulo tibiarum anticarum tarsisque nigricantibus. Long. 18, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.
3. *P. hottentottus*: sordide flavescens; thorace maculis nigrofuscis minutis 6, (2, 2, 2); hemelytris fuscogriseis, maculis 2 magnis costalibus, flavoalbidis; annulo tibiarum anticarum tarsisque nigrofuscis. Long. 18, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.
4. *P. hyalinipennis*: punctatus, capite pedibusque testaceis; thorace scutelloque virescentibus; hemelytris sordide hyalinis, parce brunnescentepunctatis. Long. 9, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

5. *P. actuosus*: flavotestaceus, subtus cum pedibus obscurior; capite antice angulum fere rectum, obtusatum formante; hemelytris medio latioribus, dense fuscescente undulatis. Long. 12, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
6. *P. natalensis*: flavotestaceus, subtus cum pedibus fuscovarius; capite fere semicirculari; hemelytris ante medium latioribus, fuscescente-irroratis et subundulatis. Long. 11, lat. 4½ millim. — In terra Natalensi.
7. *P. umbrosus*: flavotestaceus, interdum etiam subferrugineus, subtus obscurior; capite obtuse triangulari, apice rotundato; hemelytris medio fere latioribus, ibique, licet parum, subsinuatis, fuscoirratis, fasciis 2 vel 3 obliquis, fuscis ornatis. Long. 9—10, lat. 4½—5 millim. — In terra Natalensi.
8. *P. latiusculus*: flavotestaceus; capite obtuse triangulariter producto; hemelytris medio latioribus, margineque ibi nonnihil elevato, fuscoirratis, fasciis, una obsoleta ante medium, secundaque pone medium opposita, obliquis, fuscescentibus, una alterave interdum obsoleta. Long. 7—8, lat. 4—5 millim. — In terra Natalensi.
9. *P. prolixus*: dilute flavotestaceus; capite thoraceque longitudinaliter fuscolineatis; hemelytris vitta punctoque suturali nigrofuscis; fronte pectoreque fuscis, fascia utrimque flava ornatis. Long. 9, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
10. *P. peragrans*: sordide flavoalbidus; hemelytris margine pallidioribus, nervis fuscis, punto pone medium nigricante; abdomine supra lutescente; tarsis apice fuscis. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

TETTIGONIA (GEOFFR.).

1. *T. Signoreti*: nigrofusca, hic illic violaceo-induta et micans; hemelytris apice truncatis, ante medium albidoirroratis, pone medium maculis 2, punto margineque apicali albidoxylinis; subtus cum pedibus flava. Long. 6, lat. 1½ millim. — In terra Natalensi.
2. *T. actuosa*: statura omnino præcedentis; dilute flavotestacea; hemelytris apice truncatis, dilute fuscescente hyalinis, ante medium albidosparis, macula magna margineque apicali albidoxylinis; subtus cum pedibus flavoalbida. Long. 6, lat. 1½ millim. — In terra Natalensi.

BOHEMANIA (STÅL).

(EURYPROSOPUM *) STÅL loc. cit. p. 267).

1. *B. sobrina*: sordide flavoalbida, valde punctata; hemelytris albidis, punto ante medium nigro, nervis fuscis, cellulis nonnullis punctis

*) Initio anni 1853, quo fere exeunte genus hocce novum descripsi, Dom White in *List of Coleopt. P. VII* genus Longicornium nomine eodem designavit.

vel callis minutis fuscis instructis; pedibus flavoalbidis, fuscovariis.
Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

2. *B. patruelis*: flavotestacea, punctata; hemelytris sordide albidis,
puncto, nervis fasciaque obsoleta media flavotestaceis; pedibus
fuscovariis. Long. 5, lat. $1\frac{2}{3}$ millim. — In terra Natalensi.

PENTHIMIA (GERM.).

1. *P. vinula*: nigricans; hemelytris dense, obsolete albidoirroratis, ma-
culis suturali costalique et pluribus minoribus apicis albido-
hyalinis. Long. 4, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
2. *P. bella*: flavoalbida, nigroirrorata; hemelytris dense fusco nigroque
irroratis, maculis suturali, costali et pluribus minutis apicis albido-
hyalinis; femoribus nigris, tibiis flavotestaceis. Long. 4, lat. 2
millim. — Ad Rondebosch..

ACOCEPHALUS (GERM.).

1. *A. punctiger*: dilute olivaceus; capite medio longitudinaliter elevato,
hemelytris macula media nigricante; abdomine basi lutescente.
Long. 6, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Ad Rondebosch.
2. *A. vitticollis*: flavus, capite thoraceque luteo-lineatis; hemelytris
flavotestaceis, apice obscurioribus, ad suturam macula minuta
fusca. Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
3. *A. missellus*: niger; capite, thorace scutelloque basi flavis. Long.
3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
4. *A. blennius*: sordide albidus; fronte apice fusca; hemelytris dense
fuscopunctatis, macula costali ante medium dilutiore; abdomine
pedibusque fuscouscentibus. Long. 4, lat. $1\frac{2}{3}$ millim. In terra
Natalensi.
5. *A. funebris*: nigricans; capite albidovario; thorace transversim albido-
bifasciato; hemelytris fascia ante medium fronteque apice albidis.
Long. 4, lat. $1\frac{2}{3}$ millim. — In terra Natalensi.
6. *A. viduus*: nigricans; fronte apice albida; femoribus flavotestaceis.
Long. 4, lat. $1\frac{2}{3}$ millim. — In terra Natalensi.

SELENOCEPHALUS (GERM.).

1. *S. decurtatus*: brevis, testaceus; vertice margine maculis nonnullis
minutis, scutello basi macula, hemelytris maculis 2 vel 3 sutura-
libus minutis, nigrofuscis. Long. 5, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra
Natalensi.

COELIDIA (GERM.).

1. *C. lineoligera*: sordide albida, brunneosparsa; hemelytris basi, medio
et apice fascia indistincta dilute brunnescente, lineis 4 (2. 2.),

maculis 3 suturalibus minutis limboque apicali albidis. Long. 6, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

2. *C. fuscovaria*: sordide albida; vertice maculis 2 dilute brunnescens-tibus; thorace dilute brunnescente, albidovario; hemelytris nervis fuscovariis; tibiis posticis intus nigrofuscis, extus longitudinaliter nigropunctatis. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

PLATYMETOPIUS (BURM.).

1. *P. rubrolineatus*: flavoalbidus, supra cum fronte miniato-lineatus. Long. 3, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

DELTOCEPHALUS (BURM.).

1. *D. flavovirescens*: flavus; hemelytris pone medium albidohyalinis; abdomine, margine luteo excepto, maculisque pectoris nigricantibus. Long. 4, lat. $1\frac{1}{3}$ millim. — In terra Natalensi.

JASSUS (FABR.).

1. *I. rorulentus*: albidus, totus subtiliter fuscosparsus; thorace maculis 4 minutis, hemelytris maculis 3 vel 4 suturalibus pluribusque costalibus distinctioribus, minutis, fuscis. Long. 8, lat. 3 millim — In terra Natalensi.
2. *I. amœnus*: supra obscurius flavoalbidus, subæneomicans, subtus cum pedibus albidus; vertice fuscescente, albido-4-maculato; hemelytris nervis brunnescens-tibus, maculis 4 suturalibus minutis, fuscescentibus, maculisque 2 oblongis costalibus, vitreis. Long. 7, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
3. *I. dilectus*: capite thoraceque flavis, fronte lineis transversis, vertice maculis 6, quarum 4 anticis transversis, thorace maculis 2 majoribus, fuscis; hemelytris fuscohyalinis, aureomicantibus; abdomine nigricante, margine flavo. Long. 5, lat. $1\frac{1}{3}$ millim. — Ad Rondebosch.

ATHYSANUS (BURM.).

1. *A. severus*: fuscus; fronte obsolete transversim sordide albidolineata; thorace hemelytrisque dense, subtiliter flavosparsis, horum nervis flavopunctatis. Long. 6, lat. 3 millim. — Ad Rondebosch.
2. *A. capicola*: flavoalbidus; capite intra oculos linea nigra; fronte transversim fuscolineata; thorace antice punctis 6 nigris, interdum obsolete; hemelytris sordide albidohyalinis, nervis fuscis; pectore fuscomaculato. Long. 6, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Ad Rondebosch.

BYTHOSCOPUS. (GERM.).

1. *B. olivaceo-viridis*: olivaceo-viridis; capite intra oculos late rotundato, vertice parallelo. Long. 5, lat. 2 millim. — Ad Rondebosch.

2. *B. (Oncopsis.) bimaculicollis*: dilute albidotestaceus; vertice thoraceque nigrobimaculatis; genis nigromaculatis; hemelytris sordide albidoxylinis, nervis dilute fuscescentibus. Long. 5, lat. 2 millim.
— In terra Natalensi.

TETTIGOMETRA (LATR.)

1. *T. patruelis*: capite thoraceque antice dilute olivaceoflavis, hoc pone medium scutelloque brunneis; hemelytris dilute olivaceis, margine scutellari maculisque 3 fuscobrunneis, subnitidis. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

Inlemnade Afhandlingar.

Af Herr Studerande AUG. EM. HOLMGREN: Entomologiska anteckningar under en resa i södra Sverigg år 1854.

Remitterades till Hrr WAHLBERG och BOHEMAN.

Af Herr Bergmästaren v. SCHEELE: Meteorologiska observationer anställda vid Philipstad.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.