

HEMÍPTEROS NUEVOS

DEL

MUSEO DE MADRID,

POR

DON IGNACIO BOLÍVAR.

(Sesión del 5 de Marzo de 1879.)

Coptosoma Colmeiroi Bol.

Flavescens, pronoto scutelloque remotè nigro-punctatis, capite rotundato; jugis anticè convergentibus, apice ipso sub-contiguis, ocellis ab oculis minus quam inter se distantibus; pronoto anticè spatio lævi strigis duabus nigris arquatis notato, instructo; posticè scutelloque, basi exceptâ, viridibus; pectoris disco, abdominalisque fasciis tribus longitudinalibus, lateralibus sub-interruptis, nigris; ventris segmentorum basi disco utrinque impressionibus transversis abbreviatis, punctatis; pedibus flavo-rufescensibus, unguiculis apice nigris; tibiis supernè sulco obsoletissimo instructis.

Long. corp., 0^m,005; lat., 0^m,0045.

Patria. Zanzibar (*Raffray!*).

OBS. Especie notable por la coloracion y por la forma del cuerpo, que es casi tan ancho posteriormente como largo.

Dedicada al Excmo. Sr. D. Miguel Colmeiro, Director del Museo de Ciencias naturales y del Jardín Botánico de Madrid.

Coptosoma Raffrayii Bol.

Flavescens, pronoto scutelloque confertè fusco-punctatis, obsoletissimè fusco-aenescente maculatis; capite rotundato, anticè subsinuato, jugis convergentibus, apice ipso contiguis; ocellis ab oculis minùs quam inter se distantibus; tylo utrinque lineola nigrâ abbreviatâ; capitî basi angustè nigrâ; pronoto anticè minùs punctato, lituris duabus nigris; corpore subtùs nigro, pectoris lateribus expansis, abdominis marginibus nec non pedibus flavis; ventre punctatissimo, tibiis teretibus.

Long. corp., 0^m,0045; lat., 0^m,0035.

Patria. Abyssinia (*Raffrayi*).

OBS. Próximo al *C. nubilum* Germ., pero bien distinto. La multitud de puntos pardo-bronceados que le cubren por encima le dan un color distinto del que presenta si se le examina con la lente.

Dedicada al viajero y naturalista francés Sr. Aquiles Raffray.

Cœlocoris, gen. nov.

Corpus oblongo-ovatum, suprà subtùsque modicè convexum, glabrum; capite latitudine sua paullò longiore, trianguli, valdè deflexo, brevi, convexo; tylo genisque subæquè longis; bucculis valdè elevatis; antennis 5-articulatis, articulo quinto longiori, incrassato, subfusiformi, quarto gracili, tertio apice incrassato secundo paullò longiori, hoc recto; antennarum basi processo infraoculari obtectâ: pronoto hexagono, transverso, anticè declivi, angulis posticis plûs minùsve rotundatis, lateralibus obtusis abdomen superantibus; scutello abdome paullò longiori, latissimo, posticè angustato, non caudato; hemelytrorum margine externâ basi tantùm conspicuâ; pectore profundè sulcato, sulci marginibus haud elevatis; prosterni margine anticâ nec lobata nec productâ; pedibus

brevibus, tibiis anticis subsulcatis, marginatis; abdomine subtus non sulcato, basi tuberculo brevi armato; incisuris curvatis; lateribus nec dentatis, nec productis.

OBS. Corresponde este género á la division *Odontotarsaria* Stål, *En. hem.* III y viene á colocarse cerca del *Alphocoris*, del que se distingue por no tener el cuerpo tomentoso ni sericeo, por las antenas que son más largas que la cabeza, y sobre todo por la prolongacion infraocular que cubre la base de éstas, carácter que no se observa en ninguno de los géneros conocidos.

Cœlocoris æliodes Bol.

♀. Flavo-virescens, suprà punctatus; antennis ferrugineis, brevissimè flavo-pilosis, articulo quinto oblongo-ovato; rostro ferrugineo, apice fusco; bucculis valdè elevatis, subtus truncato-rotundatis; pronoto anticè angustato, declivi, posticè utrinque obtusè gibboso, margine antica non incisa; scutello elongato, apice angusto, marginibus rectis, carinâ mediâ indistinctâ, lateribus ponè medium impressione obliqua subindistincta; pedibus flavis, ferrugineo-maculatis, femoribus sub-incrassatis, tibiis subtus pilosis; abdomine punctato, cónico, apice truncato.

Long. corp., 0^m,005; lat. pron., 0^m,0025.

Patria. Abyssinia (Raffray!).

Cœlocoris gibbosus Bol.

♀. Flavo-ferrugineus, suprà punctatus; pronoto anticè valdè declivi, posticè transversim elevato, carinâ mediâ conspicuâ, margine anticâ rectâ; angulis posticis rotundatis, ferrugineo-fusco-maculatis; scutello usque ad medium subparallelo et carinato, posticè subangustato, declivi, apice rotundato, basi elevato, utrinquè tuberculo flavo, depresso, maculis tribus fusco-ferrugineis prope medium in seriem transversam no-

tato; pedibus corpore concoloribus, tibiis sulcatis, subtus subserulatis; abdomine convexo, incisuris valde curvatis.

Long. corp., 0^m.0035; lat. pron., 0^m.002.

Patria. Abyssinia (Raffray!).

OBS. Se distingue esta especie de la anterior no sólo por su tamaño y coloracion, sino principalmente por la forma del escudete, tan diferente en ambas especies, que tal vez debieran constituir géneros diversos.

Leptolobus zanzibaricus Bol.

Flavo-rufescens; capite, antennis, rostro pedibusque nigro-cæruleis; pronoti marginibus lateralibus, spinis, plagâque magnâ laterali lobuli postici, scutelli alterâ sub-basali, corii maculâ subtransversâ mediâ, maculis oblongis mesosternalibus ante coxas, alteris externis, magnis, metasternalibus, angulis apicalibus, abdominalisque segmentorum plagâ basali sub-rotundâ nec non segmenti penultiimi apice, nigro-violaceo-cæruleis; pronoti lobulo postico, scutelloque punctatis; membranâ fusco-nigrâ, apice subpellucidâ.

Long. corp., 0^m.012.

Patria. Zanzibar (Raffray!).

OBS. Especie bien distinta del *L. Murrayi* Sign., de Calabar, única conocida.

Tornosia, gen. nov.

Corpus oblongum, parùm convexum; capitis genis tylo longioribus, antice contiguis; bucculis modicè elevatis, dente brevi armatis, posticè abbreviatis, depressis; tuberculis anteniferis extùs spinosis, suprà conspicuis; antennis gracilibus, longiusculis, articulo primo capitis apicem superante, secundo tertio longiore; oculis stylatis; pronoto transverso, marginibus lateralibus anticis spinosis; scutello abdominis

apicem superante, angustissimo, subparallelo; pectore abdominisque segmentis basalibus sulcatis; pedibus longiusculis, tibiis supernè sulcatis; abdominis segmentorum angulis posticis acutè productis.

OBS. Género próximo al *Podops*, pero distinto por la mayor parte de los caractéres expresados.

Dedicado al Ilmo. Sr. D. Lucas de Tornos, director del Gabinete de Historia natural de Madrid.

Tornosia insularis Bol.

♂. Nigro-picea, punctata, rubro pilosa; capitis margine antica mediò depressa, antennis articulo quarto secundo longitudine ferè æquali; rostro coxas posticas longè superanti, obscurè rubro; pronoti angulis lateralibus valdè productis, marginibus lateralibus anticis trispinosis; scutello utrinque sinuato, apice rotundato-truncato: abdominis marginibus lateralibus suprà conspicuis, utrinque spinis quinque armatis.

Long. corp., 0^m,009.

Patria. Zanzibar (*Raffray!*).

OBS. Las costumbres de este insecto deben ser análogas á las del *Podops*, encontrándose del mismo modo que éste debajo de las piedras, en terrenos algo húmedos; así podría explicarse la particularidad notable de hallarse todo él cubierto por una capa blanca de aspecto terroso y al parecer puramente accidental.

Atelocera ustulata Bol.

♀. Ferrugineo-ustulata, suprà punctata; tuberculis depressis flavis sparsis; capite nigro, lineâ mediâ anticè angustatâ, flavâ; jugis rugulosis, tylo ferè brevioribus; antennarum articulo primo capitis apicem paullùm superanti, basi flavescenti; rostro piceo, abdominis basim attingenti: pronoto anticè utrinque plagâ lævi, nigrâ, instructo, denique grossè punctato, tuberculis flavis subconfluentibus; marginibus latera-

libus anticè ferrugineis, obtusè serratis; margine anticâ subcallosâ, lineâque mediâ irregulari flavis; scutello grossè punctato, lateribus pone medium sinuato, lineâ mediâ, apice, tuberculisque numerosis flavis; coriis minùs fortitè punctatis, tuberculis flavis raris; maculâ nigrâ lævi pone medium, margine apicali sinuatâ: membranâ griseo-cinereâ, abdominis apicem vix superanti; venis remotis, fuscis: pedibus fuscis, albo-pilosis; femorum basi, tibiarumque annulo ferrugineis; femoribus inermibus; abdomine suprà utrinque conspicuo, segmentorum marginibus basali et apicali flavis; lineâ sub-elevatâ mediâ ferrugineâ; subtûs ferrugineo, utrinque fasciâ latâ longitudinali fuscâ internè sericeâ, basi sulcato,

Long. corp., 0^m,013; lat., 0^m,006.

Patria. Zanzibar (*Raffray!*).

OBS. La circunstancia de carecer de antenas el único ejemplar que posee el Museo me hace dudar si esta especie podrá más bien corresponder al género *Memmia* Stål; su aspecto y coloracion me inclinan, sin embargo, á colocarla en el *Atelocera* Lap.

Brachystethus tricolor Bol.

Niger; capite posticè maculis duabus rubris; antennarum articulo quarto haud compresso; pronoti marginibus lateralibus angustissimè flavo-pictis, disco punctato, ferè varioloso: scutello punctis raris consperso; coriis rubris, punctatis, margine externâ flavâ, maculâ magnâ triangulari mediâ strigâque externâ basali nigris, membranâ nigrâ, subscabré; metasterni tuberculo parvo, anticè subtruncato et fossulato, medio transversim depresso: abdomine subtûs sanguineo, margine externâ nigro-undatâ, spiraculis nigris, disco utrinque maculis nigris longitudinaliter dispositis.

Long. corp., 0^m,016; lat., 0^m,011.

Patria, Baeza Americae equatorialis (*Martinez y Saez!*).

Aspongopus Putonii Bol.

Ovatus, fusco-niger, subtiliter rugoso-punctatus; antennarum articulo secundo tertio longitudine aequali, articulo ultimo, apiceque articuli quarti flavescentibus, hoc subdepresso: capitibus marginibus lateralibus subsinuatis, jugis antice rotundatis, cognatis; oculis vix stylatis; thorace rugoso-punctato, anticè maximè declivi; marginibus lateralibus vix reflexis; cori marginе apicali latè rotundata; scutello coriis paullò breviore, apice obscurè ferrugineo: membranā fusco-ferruginea venis pluribus fuscis irregulariter anastomosantibus, areolas complures formantibus; corpore subtus minus rugoso; pedibus nigris, femoribus subtus dentatis; tibiis subspinulosis, costatis, inter costas planis vel subsulcatis, carinā mediā ferè inconspicua instructis.

Long. corp., 0^m,016; lat., 0^m,0095.

Patria. Zanzibar (Raffray!).

Dedicado al Dr. Augusto Puton, tan conocido por sus notables trabajos sobre los insectos de este orden.

Corizus rubricosus Bol.

Sub-nitidus, niger, laevissimè cæruleus, subtus flavo-pilosus; capite laevi, antennarum articulo primo capitibus apicem non attingenti, secundo primo duplò longiori, cæteris...?; pronotogrossè punctato, margine posticā angustè flavā, maculā parvā discoidali, angulisque humeralibus externè sanguineis; scutello punctato, apice subelevato et fossulato; clavi basi flavescenti, margine scutellari apiceque nigris; coriis subhyalinis, marginibus externis, apice excepto, fasciisque irregulari transversā pone medium nigris; angulo apicali sanguineo, basi hyalino-fenestrato, summo apice nigro: membranā hyalinā abdominis apicem longè superante; pectore punctato, varioloso; metasterni angulo postico non producto, sanguineo; coxis obscurè ferrugineis; tibiis, tarsisque flavo-pilosis;

abdomine subtus sanguineo; segmenti ultimi apice latè nigro; suprà nigro, marginibus sanguineis, segmentorum angulis apicalibus nigris.

Long. corp., 0^m,006; lat., 0^m,0025.

Patria. Abyssinia (Raffray!)

Geocoris picticeps Bol.

Niger; capite rostroque flavis; oculis rubris; antennis...? articulis duobus primis corpore concoloribus: pronoto transverso, punctato, anticè callis transversis arquatis, intùs cognatis, impunctatis; marginibus lateralibus flavescentibus, posticâ mediò angustissimè flavâ; scutello æquilatero, nigropunctato; coriis pallidis, posticè plagâ fuscâ notatis, disco lèvibus, apice punctatis; punctorum serie ad clavi suturam; membranâ sordidè hyalinâ, coxis pedibusque flavescentibus; abdomine nigro, nitido, marginibus flavo-ferrugineis.

Long. corp., 0^m,0035; lat., 0^m,0015.

Patria. Abyssinia (Raffray!).

OBS. Afine al *G. amabilis* Stål, de Cafrería, pero distinto principalmente por su coloracion.

Lygæus (Spilostethus) amœnus Bol.

Niger, lèvissimè griseo-sericeus; capitis maculâ basali oblongâ, thoracis maculis tribus anterioribus marginem anticam non attingentibus, lateralibus oblongis intùs sinuatis, mediâ posticè productâ, marginibus lateralibus posticè, nec non margine posticâ, elytrorum margine externâ prope basim, pectoris segmentorum maculâ laterali, abdominisque segmentorum marginibus posticis, sanguineis; pronoti lobulo postico flavo, nigro-punctato; coriis flavescentibus, margine externâ, maculâ parvâ basali, margine posticâ, fasciâque obliquâ posteriori, anticè ampliata et sinuata usque ad medium

elytrorum ductâ, nigris: clavi apice maculâ nigrâ flavo-fenes-tratâ: membranâ albidâ, basi mediâ maculâ fuscâ.

Long. corp., 0^m,008-0^m,009.

Patria. Abyssinia (*Raffray!*).

OBS. Afine al *L. trilineatus* F., del Cabo de Buena Esperanza, pero bien distinto por la coloracion.

Largus Martinezii Bol.

♀. Rubro-ferrugineus, subtûs cinereo-villosus: antennarum articulo primo, tertio apicali excepto, secundoque nec non tibiis, testaceo-ferrugineis; capitî lineis duabus parallelis approximatis, epistomate, antennarum articulis tertio et quarto, articuli primi parte tertia apicali, tibiarum apice, tarsisque nigris; pronoti lobo antico subnitido, indistinctè fusco-variegato, lobo postico punctis magnis raris sparsis; scutello hemelytrisque punctatis; membranâ flavo-cinereâ, basi intûs infuscata; pectore femoribusque ferrugineo-fuscis, metasterni margine posticâ latâ, pallidâ: abdome flavo-ferrugineo, subnitido, segmento ultimo basi angustissimè nigro: pedibus fusco pilosis.

Long. corp., 0^m,016.

Patria. Territorium fluvii Napo Americae meridionalis (*Martinez y Saez!*).

OBS. Dedicado al señor D. Francisco de P. Martinez y Saez, profesor en la Universidad de Madrid.

Largus Amorii Bol.

♀. Niger, brevissimè cinereo-villosus; pronoti lobulo postico, nec non coriis externè punctatis; bucculis, antennarum tuberculo basique articuli primi, trochanteribus, femorum basi, abdominisque maculis subquadratis lateralibus, in angulis posticis segmentorum positis, aureis; pronoti margine

posticâ, lateralibus anticè, coriisque, vittâ transversâ exceptâ, flavis; clavi basi nigrâ: metasterni margine latâ posticâ eburneâ; abdominis segmento primo nigro, intus maculâ rubrâ; membranâ subcinerascenti.

Long. corp., 0^m,014.

Patria. Rio-quinto Americæ meridionalis (*Amor!*).
Obs. Afine al *L. fasciatus* Blanch.

Dedicada al naturalista y viajero español D. Fernando Amor.

Scantius abyssinicus Bol.

♂. Opacus, niger, punctulatus: pronoto transverso, anticè subangustato, transversim biimpresso, impressione postica profundiore, margine anticâ maculâ mediâ obscurè rubrâ, angulis anticis subcoccineis; marginibus lateralibus, abdominisque lateribus angustissimè fusco-coccineis; elytris abbreviatis, abdominis apicem non attingentibus, posticè subtruncato-rotundatis: alis brevissimis: abdome subnitido, nigro, segmentorum basi in ferrugineum vergente; rostro sulcato coxas intermedias attingenti.

Long. corp., 0^m,008; lat., 0^m,003.

Patria. Abyssinia (*Raffray!*).

Obs. Afine al *Sc. Forsterii*, pero más estrecho y con el disco del pronoto enteramente negro, así como las piezas esternales.

Harpactor rufipes Bol.

♀. Niger, flavo-sericeus et parcè pilosus; rostri articulo secundo primo longiori; capitis regionibus anteoculari et postoculari subaequè longis; pronoto lobo antico nigro, bituberculato, flavo-sericeo; lobo postico, coriis, nec non tibiis, basi apiceque exceptis, ferrugineis; marginibus lateralibus posticis, pronotique lobo postico angustissimè nigris: scutello ni-

gro, flavo-sericeo, apice subrotundato et sub-reflexo, membranâ fusco-æneâ; abdominis limbo flavo-ferrugineo.

Long. corp., 0^m,019.

Patria. Abyssinia (Raffray!).

OBS. Afine al *H. rufus*, pero diferente sobre todo por la coloracion de las tibias: en el único ejemplar examinado faltan las antenas.

Physorhynchus (Loriceras) Signoretii Bol.

♂. Nitidus, nigro-cæruleus, pronoto corallino; antennis nigro-villosis, articulo primo capitidis longitudinis, femoribus anticis mediò bituberculatis, tuberculo postico robustiore; tibiis subtus prope apicem rufescenti-pilosus: elytris subrugosis, nigris; abdominis segmento primo inter coxas transverse elevato, segmentorum omnium incisuris crenulatis.

Long. corp., 0^m,018.

Patria. Zanzibar (Raffray!).

OBS. Especie notabilísima que no puede confundirse con ninguna otra.

Dedicada al Dr. V. Signoret, cuyos conocimientos en este orden de insectos me han sido en extremo útiles para asegurarme en mis clasificaciones.

Eumerus insignis Bol.

Niger, subnitidus; antennis nigro-pilosis; rostro pilis rarissimis rubris ornato; pronoto, sulco medio anticè obsoleto, dorso lœvi, lobulo postico anticè subtiliter rugoso, transversim et lœvissimè carinato, angulis humeralibus subelevatis; hemelytris rugosis; membranâ fusco-nigrâ, maculis tribus basali-bus, mediâ majore, apiceque albidis; femoribus subtus pilosis, posticis et intermediis minutè granulatis, anterioribus valde incrassatis; fossa tibiali spongiosa longè ultra medium ductâ:

tibiis infrà apiceque extùs, nec non tarsis, rubro-pilosis: metasterni lateribus rugoso-granulatis; abdomine subtùs nitido, lèvi vel tenuissimè ruguloso, utrinque prope sulcum marginalem plùs minùsve granuloso, apice pilis raris nigris.

Long. corp., ♂ ♀, 0^m,027; lat., 0^m,0075.

Patria. Zanzibar (Raffray!).

OBS. La extension considerable que alcanzan las fositas esponjosas de las tibias me hace colocar esta notable especie en el género *Eumerus*, por más que sus analogías con las especies del *Pirates* sean muy notables. Su tamaño considerable y la falta de manchas blancas en el corio la distinguen bien de las especies congéneres.

Pelegonus victor Bol.

♂. Niger, subviolaceus; capitis marginibus lineâque transversâ posticâ, maculâ subrotundâ supra-oculari, pronoti marginibus lateralibus anticè nec non corii marginibus externis posterioribusque, flavis; membranâ dorso concolore, marginibus dilutioribus; rostro pedibusque flavo-ferrugineis; abdome fusco-ferrugineo, cinereo-villoso, disco nitido; coriis punctis flavis subindistinctis; capite lèvissimè rugoso, absque carinâ.

Long. corp., 0^m,007; lat., 0^m,0045.

Patria. Pichincha Americæ meridionalis (Martinez y Saez!).

OBS. Es el primer *Pelegonus* encontrado en América.

Naucoris Perezii Bol.

Flavo-subfuscus: capite parùm exerto, fusco maculato; spatio interoculari subquadrato: verticis lateribus sulco obliquo subarquato: pronoto fusco-consperso, margine posticâ latè cinereâ, inmaculatâ: scutello basi latissimo, utrinque sinuato, disco hemelytrisque minutissimè fusco-conspersis, externè

flavescens; abdominis suprà segmentorum angulis posticis fuscis, pilosis: segmentis ventralibus utrinque maculâ oblongâ marginali flavâ, disco subfuscō.

Long. corp., 0^m,0095.

Patria. Abyssinia (*Raffray!*).

OBS. Se distingue bien de los congéneres por los expresados caractéres.

Dedicado al Sr. D. Laureano Pérez Arcas, profesor en la Universidad de Madrid.

Enithares glauca Bol.

Flavescens; oculis fusco-ferrugineis, nigro-maculatis; pronoto anticè flavo-ferrugineo, fusco-trinotato, posticè cinereo; angulorum anticum impressione nigrâ; scutello fusco-nigro, utrinque maculâ elongatâ, anticè obliquè truncatâ, posticè angustatâ, flavâ: metanoto nigro: hemelytris basi hyalinis, apice infumatis, alis basi glaucis; pedibus flavo-ferrugineis, pilosis; femoribus posticis fusco-bilineatis; abdome suprà fusco, carinâ mediâ utrinque marginibusque intùs longè pilosis, flavis; subtùs fusco-nigro, opaco, segmentorum marginibus posticis dilutioribus; lateribus flavescens; segmento ultimo pilis longis, flavis, instructo.

Long. corp., 0^m,011; lat., 0^m,004.

Patria. Abyssinia (*Raffray!*).

Homalocephala intermedia Bol.

Flavo-virescens vel ochraceo-flavescens; capite plano, minimè carinato, pronoto plùs duplò longiori, anticè obtusè angulato; fronte latitudine sua longiore, flavâ; verticis marginibus sulcatis, sulco nigro, anticè plùs minùsve obsoleto vel concolore; pronoti carinâ mediâ conspicuâ, marginibus lateralibus nigris; hemelytrorum apice obliquè rotundato-truncatis; areolis plurimis nigris; margine costali pallidè-flaves-

centi, punctis quatuor, minutis, nigris, plūs minùsve obsoletis, maculisque internis croceis: alis infumatis, basi media, abdominisque dorso sanguineis; pectoris lateribus dilutè flavescentibus, pedibus brevissimè pilosis, tibiarum carinis fuscis; abdomine flavo, utrinque fusco-punctato.

Long. corp. ♂♀, 0^m,01-0^m,012; hemel., 0^m,011-0^m,014.

Patria. Zanzibar (*Raffray!*).

OBS. Especie intermedia entre la *H. festiva* Sp. de la India Oriental y la *H. cincta* F. del Senegal y Sierra Leona, y más próxima á la primera por la forma de la cabeza que es mucho más larga que el pronoto, pero en la especie nueva es al mismo tiempo poco estrecha por delante, y el vértice no es agudo, en lo que se distingue de la *H. festiva* Sp., así como por la coloracion de las patas y por las manchas del área marginal de los élitros.