


MÉMOIRES DE L'INSTITUT FRANÇAIS
D'AFRIQUE NOIRE

N° 53

LA RÉSERVE
NATURELLE INTÉGRALE
DU MONT NIMBA

FASCICULE IV



IFAN-DAKAR
1958

X. HOMOPTÈRES

(V. LALLEMAND det.)

Famille : CICADIDAE.

Ugada limbata F.

2 ex. Ziéla (Al 302, 4 Av). — 1 ex. Yanlé.

DISTRIB. : Afrique occidentale, Nigeria, Congo.

Ugada sp.

1 ex. Yalanzou. — 1 ex. Ziéla (Al 302).

Platypleura sp.

1 ex. Thio.

Trismarcha fuliginosa KARSCH.

2 ex. Kéoulenta. — 3 ex. Yalanzou. — 1 ex. Nzo. — 1 ex. Ziéla (2 Al).

DISTRIB. : Afrique occidentale.

Famille : CERCOPIDAE.

Sous-famille : CERCOPIINAE.

Locris quadrinotata LALL.

3 ex. Yalanzou. — 1 ex. Ziéla (4 M).

DISTRIB. : Sierra Leone, Afrique occidentale française : Tonkoui.

Locris quadrinotata f. *obliterata* LALL.

2 ex. Yalanzou. — 1 ex. Kéoulenta.

DISTRIB. : Sierra Leone, Afrique occidentale française : Tonkoui.

Locris atra LALL.

11 ex. Yalanzou. — 2 ex. Yanlé. — 2 ex. Nzo.

DISTRIB. : Libéria, Côte d'Ivoire, Vieux Calabar, Dahomey.

Locris pullata STÅL.

4 ex. Mont Richard-Molard, prairie d'altitude (75 Pa). — 4 ex. Nzo. — 2 ex. Camp 2, prairie d'altitude (76 Pf). — 7 ex. Piste Sempéré, prairie, 1 360 m (17 Pa, 32 Pa). — 1 ex. Camp 3, tête de ravin (73 Nc). — 2 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (47 K). — 1 ex. Mont Tô, Camp 1 (51 Pc).

DISTRIB. : Côte d'Ivoire, Togo, Guinée française (Nimba), Dakar, Congo.

Locris maculata F.

3 ex. Thio. — 4 ex. Yalanzou. — 7 ex. Bossou, brousse secondaire (46 Kj). — 4 ex. Sérengbara. — 1 ex. bowal du Niomouya (11 Ff). — 21 ex. Nzo.

DISTRIB. : Une espèce des plus abondantes et des plus répandues : Afrique occidentale française (Dahomey, Côte d'Ivoire), Cameroun, Congo français et belge (Ouélé, Itouri, Kasaï, Kivou, Mayombé. Parc national Albert).

Jeanneliensia sublimpida LALL.

3 ex. Nion. — 3 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m. — 3 ex. Yalanzou. — 1 ex. Yanlé. — 1 ex. Ziéla (2 Al).

DISTRIB. : Afrique occidentale française : Guinée, Assinie, Côte d'Ivoire.

Hemitriecphora xanthospila STÅL f. **bimaculata** LALL.

1 ex. Yanlé. — 1 ex. Thio.

DISTRIB. : Côte d'Ivoire.

Hemitriecphora xanthospila STÅL f. **obliterata** LALL.

1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Cameroun.

Paramonecphora karschi DISTANT.

1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Gabon, Libéria, Afrique occidentale française.

Literna nigra DE GEER.

2 ex. Ravin Oulanda (66 Dh, 66 Na). — 12 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Afrique occidentale française, Afrique du Sud (sec. STÅL).

***Literna villiersi* LALL.**

1 ex. Mont Nimba.

DISTRIB. : Afrique occidentale française.

***Literna unifascia* JAC.**

9 ex. Ziéla (2 A, 4 Av 17, 4 Ab). — 2 ex. Mont Tô, prairie, 1 650 m (16 Pa). — 4 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Togo.

***Literna tartemorion* NOUALH.**

2 ex. Yalanzou. — 1 ex. Yanlé. — 1 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m.

DISTRIB. : Afrique occidentale française, Gold Coast, Haut Uellé.

Sous-famille : APHROPHORINAE.

***Ptyelus grossus* F.**

7 ex. Ziéla (2 A, 2 Al, 4 Av). — 2 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Espèce très répandue et abondante : Afrique occidentale française, Dahomey, Congo, Abyssinie, Angola, Transvaal.

***Ptyelus grossus* F. f. *fasciata* DISTANT.**

1 ex. Sérengbara. — 2 ex. Ziéla (4 Av).

***Ptyelus flavescens* F. f. *olivaceus* F.**

28 ex. Ziéla (Al 302, 2 Al, 4 Av).

DISTRIB. : Espèce très répandue et abondante : Afrique occidentale française, Oubangi, Congo.

***Ptyelus flavescens* F. f. *delagorguei*.**

4 ex. Mont Nimba.

DISTRIB. : Angola, Transvaal, Afrique du Sud, Afrique orientale : Amani.

***Ptyelus iturianus* LALL.**

1 ex. Ziéla (4 Av).

DISTRIB. : Congo belge : lac Albert, Ituri, Afrique occidentale française.

***Poophilus terrenus* WALKER.**

10 ex. Yanlé. — 18 ex. Nzo. — 18 ex. Yalanzou. — 9 ex. Nion. — 1 ex. Sérengbara. — 1 ex. Mont Tô (1 600 m). — 1 ex. Camp IV (1 000 m). — 7 ex. Bossou, brousse secondaire

(69 Kc, 69 Ka). — 5 ex. Véblo, brousse secondaire (36 Kb, 36 Kc). — 3 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (70 Ka). — 1 ex. Bié, brousse secondaire (25 Ka). — 1 ex. prairie Niomouya (11 Fd). — 9 ex. Ziéla, savane (6 C 21, 6 C 9, 6 C 19). — 16 ex. Camp 3, forêt dégradée de tête de ravin (73 Na, 73 Nc). — 1 ex. Gouéla, prairie sur carapace (21 Fb). — 1 ex. Piste de Bié, savane, 1 000 m (87 Cd). — 36 ex. Crête de Nion, forêt dégradée, 1 300 m (83 Nb). — 5 ex. Bié. — 2 ex. Nion, brousse secondaire (67 Ka). — 6 ex. Ziéla, jardin (3 Mh, 3 Me). — 2 ex. Ziéla (2 Al, 4 Av 17). — 2 ex. Crête au-dessus de Nion, prairie (85 Fc).

DISTRIB. : Espèce très commune : Afrique occidentale, Togo, Dahomey, Congo, Angola, Abyssinie, Transvaal, Afrique du Sud.

Poophilus costalis WALKER.

6 ex. Pierré Richaud, 900 m. — 14 ex. Mont Nimba. — 2 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Espèce très répandue : Afrique occidentale, Cameroun, Fernando-Poo, Congo, Érythrée, Indes, Formose.

Poophilus grisescens SCHAUM.

1 ex. Ziéla, savane (6 C 19). — 1 ex. Yalanzou. — 1 ex. Gouéla, prairie sur carapace (21 Fc).

DISTRIB. : Afrique occidentale, Afrique orientale anglaise (Mombasa), Congo, Angola, Érythrée, Abyssinie, Transvaal.

Sepullia murrayi SIGN. f. **viridicollis** MEL.

2 ex. Nion. — 30 ex. Camp 3, forêt dégradée de tête de ravin (73 Na, 73 Nb). — 1 ex. Entre Nzo et Bié, brousse secondaire.

DISTRIB. : Afrique occidentale française, Gold Coast, Congo.

Cordia peragrans STÅL.

3 ex. Ziéla, savane (6 C 19, 6 C 21). — 5 ex. Pierré Richaud, prairie, 1 400 m (28 Pa, 28 Pc). — 1 ex. Piste de Bié, 1 200 m (38 Pc).

DISTRIB. : Afrique occidentale, Congo, Angola, Transvaal.

Cordia albilatera STÅL.

1 ex. Ouyakoré, savane (26 E). — 2 ex. Pierré Richaud, prairie, 1 500 m (28 Pc). — 1 ex. Mont Tô, prairie, 1 650 m (51 Pb). — 3 ex. Piste de Bié, de 1 000 à 1 400 m (90 Pa, 38 Pc, 31 Pa).

DISTRIB. : Congo, Transvaal.

Clovia lepesmei LALL.

8 ex. Camp 3, prairie d'altitude (73 Pf). — 5 ex. Mont Richard-Molard, prairie d'altitude (75 Pa, 75 Pb). — 16 ex. Mont Tô, prairie d'altitude (51 P, 100 Pa). — 1 ex. Pierré Richaud, prairie, 1 370 m (13 Pb). — 1 ex. Plateau de Zouguépo, 1 000 m (40 Pc).

***Clovia bigoti* SIGN.**

3 ex. Yanlé. — 1 ex. Yalanzou. — 1 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m.
DISTRIB. : Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée (Nimba), Congo.

***Clovia patruelis* STÅL.**

1 ex. Ziéla, savane (6 C 19). — 2 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (47 K, 70 Ka). —
1 ex. Ziéla, savane (101 C).
DISTRIB. : Congo français et belge.

***Clovia pauliani* LALL.**

9 ex. Mont Tô, 1 650 m. — 13 ex. Mont Tô, Camp I, prairie (14 P, 51 P). — 3 ex. Pierré
Richaud, prairie, 1 400 m (28 Pc). — 8 ex. Camp 3, prairie (73 Pf). — 33 ex. Mont Richard-
Molard, prairie (75 Pa, 75 Pb). — 3 ex. Camp 2, prairie (76 Pb, 76 Pg). — 2 ex. Crête de Nion,
prairie (85 Fc).

DISTRIB. : Guinée (Nimba), Côte d'Ivoire, Monts Bambouto.

***Clovia pseudoprolixa* LALL.**

2 ex. Mont Nimba.
DISTRIB. : Congo belge.

***Clovia declivis* Jac.**

5 ex. Ziéla, savane (6 C 9, 6 C 21).
DISTRIB. : Guinée (Nimba), Congo (Elisabethville, Musosa, Ngouré), Mont Kilimandjaro.

***Neolepyroniella apicata* SCHMIDT.**

1 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m. — 2 ex. Yanlé.
DISTRIB. : Afrique occidentale française, Côte d'Ivoire, Cameroun.

***Neolepyroniella camerunensis* SCHMIDT.**

2 ex. Nion.
DISTRIB. : Cameroun.

Sous-famille : MACHAEROTINAE.

***Enderleina bispina* SCHMIDT.**

1 ex. Yalanzou.
DISTRIB. : Côte d'Ivoire : Bingerville, Congo : Kivu.

Famille : FULGORIDAE.

Rhinortha cincta F.

2 ex. Nzo. — 1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Sierra Leone, Sénégal, Dahomey, Mauritanie, Niger, etc...

Anecphora aurantiaca KARSCH.

2 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Sierra Leone, Guinée (Nimba), Libéria, Gabon.

Famille : EURYBRACHIDAE.

Aspidioxys incertus LALL.

2 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m.

DISTRIB. : Cameroun.

Famille : CIXIIDAE.

Cixius mubalensis SYN.

2 ex. Mont Tô, prairie (62 Pf). — 3 ex. Camp 2, prairie (76 Pf, 76 Ph).

DISTRIB. : Congo belge : Upemba, Mubale.

Oliarus moestus virgultivagus HESSE.

4 ex. Camp 2, prairie d'altitude (76 Pc).

DISTRIB. : Congo, Transvaal.

Brixia sp.

1 ex. Nion.

Famille : DICTYOPHORIDAE.

Rhaphiophora vitrea SCHAUM.

1 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (47 K).

DISTRIB. : Cameroun, Sénégal, Caffrerie (*sec.* STÅL).

Fernandea conradti MEL.

1 ex. Gouéla, prairie sur bowal (21 Fb).

DISTRIB. : Fernando-Poo.

Centromeriana jocosa GERST.

1 ex. Yalanzou. — 1 ex. Nzo. — 1 ex. Ziéla (2 A).

DISTRIB. : Afrique occidentale française, Cameroun, Sierra Leone, Fernando-Poo.

Paranagnia aethiopica MEL.

1 ex. Ziéla (4 Av 17).

DISTRIB. : Afrique orientale anglaise, Éthiopie méridionale (Mont Assabot).

Nersia paupera MEL.

1 ex. Ziéla (2 Al 21). — 1 ex. Ziéla, savane à *Andropogon* (6 C 19).

DISTRIB. : Togo.

Dictyophora validirostris STÅL.

1 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (47 K).

DISTRIB. : Sierra Leone, Cameroun, Togo.

Dictyophora elliptica WALKER.

1 ex. Kéoulenta. — 1 ex. Camp IV (forêt, 1 000 m). — 2 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Sierra Leone, Cameroun, Togo, Gabon, Fernando-Poo, Congo français.

Dictyophora sp.

1 ex. Crête au-dessous de Nion, prairie sur carapace, 1 300 m (85 Fc).

Paradictya bicoronata MEL.

2 ex. Ziéla (Al 302 ; 4 Av 17). — 1 ex. Ziéla, savane à *Andropogon* (6 C 19).

DISTRIB. : Tanga, Usambara.

Famille : LOPHOPIDAE.

Lophops angustipennis STÅL.

3 ex. et 2 larves. Ziéla, savane (7 Ca, 7 Cb). — 1 ex. Kéoulenta. — 2 ex. Yalanzou. —
2 ex. et 1 larve. Camp du Ya (47 K).

DISTRIB. : Sénégal.

Elasmoscelis trimaculata WALKER.

1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Sierra Leone, Sénégal, Guinée portugaise, Afrique orientale : Usambara,
île Socotra, Rhodésie.

Mont Nimba.

Elasmoscelis cimicoïdes SPIN.

1 ex. Ziéla, savane à *Andropogon* (6 C 19). — 1 ex. Kéoulenta, savane à *Andropogon* (53 Cf).

DISTRIB. : Caffrerie, Usambara, Kilimandjaro, Congo.

Famille : TROPIDUCHIDAE.

Numicia taenia F.

2 ex. Ziéla, jardin (3 Mh, 3 Mb). — 2 ex. Kéoulenta, savane (53 C). — 1 ex. Piste du Pierré Richaud, savane, 850 m (57 Cb).

DISTRIB. : Guinée portugaise, Sierra Leone.

Famille : RICANIIDAE.

Sous-famille : RICANIINAE.

Pochazia incompleta MEL.

1 ex. Ziéla, jardin.

DISTRIB. : Afrique occidentale, Congo.

Ricania (Ricania) morula MEL.

1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Afrique occidentale, Cameroun.

Ricania (Ricania) cervina MEL.

1 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Afrique occidentale, Togo, Cameroun.

Ricania (Ricanula) detersa MEL.

1 ex. Ziéla, savane à *Andropogon* (6 C 19). — 1 ex. Kéoulenta, savane à *Andropogon* (53 Cf).

DISTRIB. : Afrique occidentale, Togo.

Ricanopsis nebulosa FABR.

2 ex. Yalanzou.

DISTRIB. : Cameroun, Sénégal, Gold Coast.

Ricanopsis nebulosa f. semihyalina MEL.

1 ex. Ziéla (4 Av 17-1).
DISTRIB. : Togo, Sénégal.

Sous-famille : NOGODINAE.

Epacria reticulata GERST.

1 ex. Camp IV, forêt, 1 000 m.
DISTRIB. : Cameroun.

Famille : FLATTIDAE.

Tribu : PHROMMINI.

Ityraea ignota JAC.

2 ex. Kéoulenta.
DISTRIB. : Congo : Eala.

Phrommia pallida OLIV.

2 ex. Kéoulenta. — 2 ex. Nzo.
DISTRIB. : Afrique occidentale française, Sierra Leone, Congo, Afrique orientale : Tanganyika.

Phrommia superba MEL.

1 ex. Yalanzou. — 1 ex. Ziéla (2 Al).
DISTRIB. : Afrique occidentale française, Sierra Leone, Cameroun, Gold Coast, Sud Nigeria, Congo.

Tribu : SISCIINI.

Paranotus rufilinea WALK.

4 ex. Nion. — 1 ex. Ziéla, jardin (3 Bb). — 1 ex. Kéoulenta, savane (7 Ca). — 3 ex. Sérengbara, bowal (45 Fa). — 2 ex. piste de Bié, savane, 1 000 m (87 Ca).
DISTRIB. : Sénégal, Afrique orientale anglaise : Kilimandjaro.

Tribu : NEPHESINI.

Gyaria limbipuncta KARSCH.

1 ex. Nion. — 1 ex. Thio.
DISTRIB. : Afrique occidentale.

Famille : LEDRIDAE.

Coloborrhis corticina GERM.

3 ex. Nion. — 6 ex. Mont Tô, 1 600 m.

DISTRIB. : Caffrerie (STÅL), Congo, Afrique orientale anglaise : Kilimandjaro, Angola.

Famille : CICADELLIDAE.

Tettigoniellea nigrinervis STÅL.

3 ex. Nion. — 1 ex. Mont Tô, Camp I, 1 600 m. — 4 ex. Ziéla, jardin (3 Mb, 3 Mh). — 17 ex. Camp 3, forêt dégradée de tête de ravin (73 Na, 73 Nb, 73 Ne).

DISTRIB. : Nigeria : Calabar, Congo belge, Afrique orientale anglaise : Kilimandjaro : Mérou.

Tettigoniella albida SIGN.

1 ex. Bié. — 1 ex. Yalanzou. — 2 ex. Ziéla, savane (6 C 9, 6 C 21). — 1 ex. Bossou, brousse secondaire (46 Kp). — 2 ex. Camp du Ya, brousse secondaire (47 K, 70 Ka). — 1 ex. Nion, brousse secondaire (67 Ka). — 1 ex. Camp 3, prairie d'altitude (73 Pf). — 10 ex. Mont Richard-Molard, prairie d'altitude (75 Pa).

DISTRIB. : Caffrerie (STÅL), Congo, Afrique orientale anglaise, Éthiopie.