



日本昆虫目録

Catalogue of the Insects of Japan

第4巻 準新翅類

Volume 4 Paraneoptera

日本昆虫目録編集委員会 編集
Edited by the Editorial Committee of Catalogue of the Insects of Japan



日本昆虫学会 発行
Published by the Entomological Society of Japan

權歌書房
Distributed by Touka shobo

2016

Family Cixiidae ヒシウンカ科

Subfamily Cixiinae ヒシウンカ亜科

Genus *Andes* Stål, 1866 カワウンカ属

harimaensis (Matsumura, 1914) オビカワウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 431 (*Brixia*). Type locality: Honshu (Akashi, Yamato), Kiushu (Jono).
分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Oriental Region.

marmoratiformis Ishihara, 1957 ヤナギカワウンカモドキ

Ishihara, 1957, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **5**: 67 (*Andes*). Type locality: Omogo Valley, Iyo.
分布: 四国, 九州; 韓国, 極東ロシア. **Distribution**: Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, Russian Far East.

marmoratus (Uhler, 1896) ヤナギカワウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 280 (*Cotyleceps*). Type locality: Japan.
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

melanobasis Ishihara, 1957 ネグロカワウンカ

Ishihara, 1957, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **5**: 68 (*Andes*). Type locality: Omogo Valley, Iyo.
分布: 四国. **Distribution**: Shikoku.

Genus *Andixius* Emeljanov et M.Hayashi, 2007

nupta Emeljanov et M.Hayashi, 2007

Emeljanov & Hayashi, 2007, *Jpn. J. syst. Entomol.*, **13**: 130 (*Andixius*). Type locality: Mt. Yonaha-dake, Kunigami, Okinawa Is., Ryukyus.
分布: 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

Genus *Arosinus* Emeljanov, 2007

boninensis (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 423 (*Oliarus*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawarajima).
分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

Genus *Atretus* Emeljanov, 2007

ryukyucola (Van Stalle, 1991)

Van Stalle, 1991, *Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. Entomol.*, **61**: 86 (*Oliarus*). Type locality: S. Ryukyu I., Ishigaki I., Banna 70m.
分布: 八重山(石垣島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

Genus *Betacixius* Matsumura, 1914

brunneus Matsumura, 1914 セアカヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 417 (*Betacixius*). Type locality: Formosa (Tappan, Toroen).
分布: 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

kumejima Matsumura, 1914 クメヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 415 (*Betacixius*). Type locality: Okinawa (Kumejima).
分布: 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 座間味島, 阿嘉島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

obliquus Matsumura, 1914 ハスオビヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 414 (*Betacixius*). Type locality: Honshu (Gifu und Asama).
= *obliquus pallens* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 415 (*Betacixius*). Type locality: Honshu (Tokyo, Harima), Kiushu (Kumamoto).

分布:本州, 四国, 九州; 中国. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu; China.

Genus *Cixius* Latreille, 1804

hachijonis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 399 (*Cixius*). Type locality: Hachijo Insel.

分布:伊豆(八丈島). **Distribution:** Izu Islands.

hakonensis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 404 (*Cixius*). Type locality: Honshu (Hakone).

分布:本州, 対馬. **Distribution:** Honshu, Tsushima Island.

ibukisanus Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 397 (*Cixius*). Type locality: Honshu (Berg Ibuki).

分布:本州. **Distribution:** Honshu.

iguchii (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 407 (*Trirhacus*). Type locality: Kiushu (Nakatsu).

分布:九州. **Distribution:** Kyushu.

matsumurai Metcalf, 1936

Metcalf, 1936, *Gen. Cat. Hem.*, **4** (2): 181 (*Cixius*). Replacement name for *Cixius centralis* Matsumura, 1914.

= *centralis* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 405 (*Cixius*). Type locality: Honshu (Aomori).

Junior homonym of *Cixius centralis* Signoret, 1860.

分布:本州. **Distribution:** Honshu.

nawae Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 402 (*Cixius*). Type locality: Honshu (Berg Ibuki).

分布:本州, 対馬. **Distribution:** Honshu, Tsushima Island.

nervosus (Linnaeus, 1758) オビヒシウンカ

Linnaeus, 1758, *Syst. Nat.*, **10**: 437 (*Cicada*). Type locality: Europa.

分布: ?北海道; ?韓国, ?中国, 極東ロシア, シベリア西部, カザフスタン, 南コーカサス, ヨーロッパ, 旧北区, 北アメリカ. **Distribution:** ?Hokkaido; ?Korean Peninsula, ?China, Russian Far East, ?Russian Far East, W. Siberia, Kazakhstan, Transcaucasia, Europe, Palaeartic Region, N. America.

okinawanus Matsumura, 1936 オキナワヒシウンカ

Matsumura, 1936, *Ins. Mats.*, **10**: 83 (*Cixius*). Type locality: Okinawa (Shuri).

分布: 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 慶留間島, 阿嘉島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

towadensis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 402 (*Cixius*). Type locality: Honshu (Hakone und Towada bei Aomori).

= *cingulatus* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 403 (*Cixius*). Type locality: Hachijo Insel.

分布:本州, 伊豆諸島; 極東ロシア. **Distribution:** Honshu, Izu Islands; Russian Far East.

yohenai Matsumura, 1936

Matsumura, 1936, *Ins. Mats.*, **10**: 83 (*Cixius*). Type locality: Okinawa (Kumejima).

分布: 沖縄(久米島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

Genus *Dystheatias* Kirkaldy, 1907

(Subgenus *Dystheratus* Emeljanov et M.Hayashi, 2007)

mangroveicus Emeljanov et M.Hayashi, 2007

Emeljanov & Hayashi, 2007, *Jpn. J. syst. Entomol.*, **13**: 132 (*Dystheatias*). Type locality: Hoshidate, Iriomote Is., Ryukyus.

分布: 八重山(西表島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

Genus *Kirbyana* Distant, 1906

pacifica Emeljanov et M.Hayashi, 2007 セウスヒシウンカ

Emeljanov & Hayashi, 2007, *Jpn. J. syst. Entomol.*, **13**: 136 (*Kirbyana*). Type locality: Ôkuni For. Rd., Kunigami, Okinawa Is., Ryukyus.

= *pagana*: Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 434 (*Kirbyana*) (not Melichar, 1903).

分布: 奄美(奄美大島, 徳之島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 座間味島, 阿嘉島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 東洋区. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region.

Genus *Kuvera* Distant, 1906

flaviceps (Matsumura, 1900) キガシラヒシウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 208 (*Oliarus*). Type locality: Japan (Gifu, Kyoto).

= *flaviceps costalis* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 409 (*Kuvera*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

= *flaviceps curvata* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 408 (*Kuvera*). Type locality: Honshu (Kogota bei Sendai).

= *flaviceps fumata* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 409 (*Kuvera*). Type locality: Honshu (Towada bei Aomori).

= *flaviceps vittata* Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 408 (*Kuvera*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布: 千島(国後島), 色丹島, 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア. **Distribution**: Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East.

ligustri Matsumura, 1914 イボタヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 409 (*Kuvera*). Type locality: Honshu (Hakone).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East.

pallidula Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 409 (var. of *Kuvera flaviceps*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布: 北海道, 本州; 極東ロシア. **Distribution**: Hokkaido, Honshu; Russian Far East.

Genus *Macrocoxius* Matsumura, 1914

giganteus Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 394 (*Macrocoxius*). Type locality: Kiushu (Kagoshima).

分布: 九州, 対馬, トカラ(横当島); 台湾. **Distribution**: Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Neocarpia* Taur et Hsu, 2003

okinawana Emeljanov et M. Hayashi, 2007

Emeljanov & Hayashi, 2007, *Jpn. J. syst. Entomol.*, **13**: 135 (*Neocarpia*). Type locality: Mt. Yonahadake, Kunigami, Okinawa Is., Ryukyus.

分布: 沖縄(沖縄本島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

Genus *Oecleopsis* Emeljanov, 1971

artemisiae (Matsumura, 1914) ヨモギヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 428 (*Oliarus*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

elevatus (Taur, Hsu et Van Stalle, 1988)

Taur, Hsu & Van Stalle, 1988, *J. Taiwan Mus.*, **41**: 53 (*Oliarus*). Type locality: Wanfeng Hill, Taichung Hsien.

分布: 本州; 台湾. **Distribution**: Honshu; Taiwan.

sinicus (Jacobi, 1944)

Jacobi, 1944, *Mitt. Münch. entomol. Ges.*, **34**: 12 (*Mnemosyne?*). Type locality: China.

分布: 九州; 台湾, 中国. **Distribution**: Kyushu; Taiwan, China.

Genus *Oliarus* Stål, 1862

angusticeps Horváth, 1892 クロヒシウンカ

Horváth, 1892, *Természetr. Füz.*, **15**: 137 (*Oliarus*). Type locality: Japonia.

分布: 北海道, 本州, 九州; 韓国. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Kyushu; Korean Peninsula.

hachijonis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 422 (*Oliarus*). Type locality: Hachijo Insel.

分布: 伊豆(八丈島). **Distribution**: Izu Islands.

harimaensis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 421 (*Oliarus*). Type locality: Honshu (Harima).

分布: 本州. **Distribution**: Honshu.

kagoshimensis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 429 (*Oliarus*). Type locality: Kiushu (Kagoshima, Futsukaichi).

分布: 九州. **Distribution**: Kyushu.

subnubilus (Uhler, 1896) オオヒシウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 279 (*Cixius*). Type locality: Japan.

分布: 本州, 九州, 対馬; 韓国. **Distribution**: Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula.

Genus **Pentastiridius** Kirschbaum, 1868

apicalis (Uhler, 1896) ヒシウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 281 (*Myndus*). Type locality: Japan.

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州; 韓国, 中国. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, China.

ogasawarensis (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 422 (*Oliarus*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawarajima).

分布: 小笠原諸島; サイパン. **Distribution**: Ogasawara Islands; Mariana Islands.

pachyceps (Matsumura, 1914) ツマグロヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 420 (*Oliarus*). Type locality: Formosa (Koshun).

分布: 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus **Reptalus** Emeljanov, 1971

iguchii (Matsumura, 1914) イグチヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 419 (*Oliarus*). Type locality: Honshu (Harima).

分布: 本州, 対馬. **Distribution**: Honshu, Tsushima Island.

quadricinctus (Matsumura, 1914) ヨスジヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 419 (*Oliarus*). Type locality: Honshu (Maiko, Sendai, Amagi, Tokyo).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

Genus **Siniarus** Emeljanov, 2007

okinawensis (Van Stalle, 1991)

Van Stalle, 1991, *Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. Entomol.*, **61**: 30 (*Oliarus*). Type locality: Ryukyu Isl., Okinawa I., Chinen.

分布: 沖縄(沖縄本島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

Subfamily **Borystheninae** ゴマダラヒシウンカ亜科

Genus **Borysthenes** Stål, 1866

maculatus (Matsumura, 1914) ゴマダラヒシウンカ

Matsumura, 1914, *Annot. zool. Japon.*, **8**: 430 (*Barma*). Type locality: Formosa (Toroen, Hoppo, Horisha).

分布: 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島); 台湾, 中国. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Family Delphacidae ウンカ科

Subfamily Ugyopinae スケバウンカ亜科

Genus *Ugyops* Guérin-Méneville, 1834

vittatus (Matsumura, 1906) シダスケバモドキ

Matsumura, 1906, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, 1: 31 (*Bidis*). Type locality: Okinawa, Ogasawara (Bonin Insel).
分布: 本州, 伊豆諸島, 小笠原諸島, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 座間味島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 台湾. **Distribution:** Honshu, Izu Islands, Ogasawara Islands, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan.

Subfamily Kelisiinae ザオウンカ亜科

Genus *Anakelisia* Wagner, 1963

perspicillata (Boheman, 1845)

Boheman, 1845, *Öfv. Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Förh.*, 2: 164 (*Delphax*). Type locality: Bahusia (Sweden).
分布: 北海道; 極東ロシア, 旧北区. **Distribution:** Hokkaido; Russian Far East, Palaearctic Region.

Genus *Kelisia* Fieber, 1866

asahinai Y.Hori, 1982 ザオウンカ

Hori, 1982, *Ins. Mats.*, 6: 76 (*Kelisia*). Type locality: Honshu, Kiushu.
= *guttula*: Hasegawa, 1957, *Yamagata Agr. Exp. Stn. Publ.* (山形県農業試験場): 4 (*Kelisia*) (not Germar, 1818).
分布: 本州. **Distribution:** Honshu.

xiphura Vilbaste, 1968

Vilbaste, 1968, *Über die Zikadenfauna des Primorje Gebietes*: 13 (*Kelisia*). Type locality: Primorsky kray, Suputinski Reserve.
分布: 本州; 極東ロシア, 中国. **Distribution:** Honshu; Russian Far East, China.

Subfamily Stenocraninae ナガウンカ亜科

Genus *Stenocranus* Fieber, 1866

agamopsyche Kirkaldy, 1906 タイワンナガウンカ

Kirkaldy, 1906, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (1): 409 (*Stenocranus*). Type locality: Queensland, Cairns.
分布: 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島); 中国, 台湾, フィリピン, 太平洋地域西部.
Distribution: Ryukyu Islands; China, Taiwan, Philippines, W. Pacifics.

chenzhouensis Ding, 1981 ホソスジナガウンカ

Ding, 1981, *Acta zootaxon. Sin.*, 6: 76 (*Stenocranus*). Type locality: China: Hunan.
分布: 本州; 中国. **Distribution:** Honshu; China.

elongatus Matsumura, 1935 ホソナガウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, 9: 127 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu (?); Jono in the Prov. Buzen.
分布: 九州. **Distribution:** Kyushu.

fallax Matsumura, 1935 ニセナガウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, 9: 128 (*Stenocranus*). Type locality: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Iwate), China (Hongkong).
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州; 中国. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu; China.

harimensis Matsumura, 1935 ハリマナガウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, 9: 129 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu; Tansanji near Akashi in the Prov. Harima; Abiko in the Prov. Chichibu.

- 分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island.
hokkaidoensis Metcalf, 1943 セスジナガウンカ
Metcalf, 1943, *Gen. Cat. Hem.*, **4** (3): 168 (*Stenocranus*). Replacement name for *Stenocranus vittatus* Matsumura, 1935.
= *vittatus* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 132 (*Stenocranus*). Type locality: Hokkaido; Sapporo. Junipor homonym of *Stenocranus vittatus* Stål, 1862.
= *minutus*: Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 26 (*Stenocranus*) (not Fabricius, 1787).
分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East.
- matsumurai** Metcalf, 1943 エゾナガウンカ
Metcalf, 1943, *Gen. Cat. Hem.*, **4** (3): 172 (*Stenocranus*). Replacement name for *Stenocranus breviceps* Matsumura, 1935.
= *breviceps* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 127 (*Stenocranus*). Type locality: Hokkaido. Junior homonym of *Stenocranus breviceps* Dozier, 1922.
分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 台湾, 極東ロシア. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Taiwan, Russian Far East.
- niisimai** Matsumura, 1935 ニイジマナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 130 (*Stenocranus*). Type locality: Hokkaido; Teshio.
分布:北海道. **Distribution:** Hokkaido.
- ozenumensis** Ishihara, 1952 オゼナガウンカ
Ishihara, 1952, *Ins. Mats.*, **18**: 35 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu (Oze).
分布:千島(国後島), 北海道, 本州, 四国; 極東ロシア. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku; Russian Far East.
- pacificus** Kirkaldy, 1907
Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 139 (*Stenocranus*). Type locality: Viti Levu, Rewa, Navua, Ba.
分布:沖縄(沖縄本島); 中国, フィリピン, パラオ, フィジー. **Distribution:** Ryukyu Islands; China, Philippines, Palau, Fiji.
- sapporensis** Matsumura, 1935 サッポロナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 131 (*Stenocranus*). Type locality: Hokkaido; Jozankei, Maruyama near Sapporo.
= *minutus*: Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 257 (*Stenocranus*) (not Fabricius, 1787).
分布:北海道, 四国; 極東ロシア. **Distribution:** Hokkaido, Shikoku; Russian Far East.
- silvicola** Vilbaste, 1968
Vilbaste, 1968, *Über die Zikadenfauna des Primorje Gebietes*: 16 (*Stenocranus*). Type locality: Primorsky kray, Suputinski Reserve.
分布:本州; 韓国, 極東ロシア. **Distribution:** Honshu; Korean Peninsula, Russian Far East.
- sukumonus** Matsumura, 1935 スクモナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 71 (*Stenocranus*). Type locality: Shikoku; Sukumo, Pref. Kôchi (Tosa).
分布:四国. **Distribution:** Shikoku.
- takasagonis** Matsumura, 1935 タカサゴナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 72 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu; Takasago, Pref. Hyogo.
分布:本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄(沖縄本島); 韓国. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula.
- tamagawanus** Matsumura, 1935 タマガワナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 131 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu; Tamagawa.
分布:本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula.
- tateyamanus** Matsumura, 1935 タテヤマナガウンカ
Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 131 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu; Tateyama.
分布:本州, 四国, 九州, 対馬. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island.

yasumatsui Ishihara, 1952 ヤスマツナガウンカ

Ishihara, 1952, *Mushi*, **24**: 5 (*Stenocranus*). Type locality: Omogo Valley, Iyo, Shikoku.

分布: 本州 (栃木県, 埼玉県, 静岡県, 三重県), 四国, 九州; 韓国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula.

Genus *Terauchiana* Matsumura, 1915

singularis Matsumura, 1915 テラウチウンカ

Matsumura, 1915, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **5**: 177 (*Terauchiana*). Type locality: Korea (Berg Kongo).

= *nigripennis* Kato, 1933, *Entomol. World*, **1**: 470 (*Terauchiana*). Type locality: Kakiomura, Kanagawaken; Yoyogi, Tokyo. クロバネテラウチウンカ.

分布: 本州, 九州; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

Subfamily **Delphacinae** ウンカ亜科

Genus *Saccharosydne* Kirkaldy, 1907

procerus Matsumura, 1910 ホソミドリウンカ

Matsumura, 1910, *Inj. Ins. Japan (Dainippon Gaichu Zensho)*, **1**: 120 (*Saccharosydne*). Type locality: Japan.

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄 (沖縄本島), 大東 (北大東島), 八重山 (石垣島, 西表島); 韓国, 極東ロシア, 中国, 台湾. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Russian Far East, China, Taiwan.

Genus *Arcofaciella* Fennah, 1956

verrucosa Fennah, 1956

Fennah, 1956, *Proc. Calif. Acad. Sci.*, (4) **28**: 467 (*Arcofaciella*). Type locality: Hong Kong, China.

分布: 八重山 (西表島, 与那国島); 中国, 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Taiwan.

Genus *Arcofacies* Muir, 1915

fullawayi Muir, 1915

Muir, 1915, *Can. Entomol.*, **47**: 320 (*Arcofacies*). Type locality: Manila.

分布: 沖縄 (沖縄本島, 久米島), 大東 (北大東島, 南大東島), 八重山 (石垣島, 西表島, 与那国島); 中国, 台湾, フィリピン, インドネシア, 東洋区. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Taiwan, Philippines, Indonesia, Oriental Region.

Genus *Belocera* Muir, 1913

sinensis Muir, 1913

Muir, 1913, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **2**: 240 (*Belocera*). Type locality: Macao and Sheiklung, China.

分布: 八重山 (西表島); 中国, 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Taiwan.

Genus *Epeurysa* Matsumura, 1900

nawaii Matsumura, 1900 タケウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 261 (*Epeurysa*). Type locality: Japan (Gifu).

分布: 北海道, 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 大隅 (屋久島), 奄美 (奄美大島, 徳之島), 沖縄 (沖縄本島), 大東 (北大東島), 宮古 (宮古島), 八重山 (石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 中国, 極東ロシア, 台湾. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

Genus *Malaxella* Ding et Hu, 1986

flava Ding et Hu, 1986 キイロヒゲナガウンカ

Ding & Hu, 1986, *Acta. entomol. Sin.*, **29**: 420 (*Malaxella*). Type locality: China: Yunnan.

= *aurunca* Yang et Yang, 1986, *Taiwan Mus. spec. Publ. Ser.*, (8): 59 (*Malaxa*). Type locality: Taiwan; Yangmingshan, Taipei.

分布: 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Genus *Purohita* Distant, 1906

cervina Distant, 1906 タケヒゲブトウンカ

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhynch.*, **3**: 470 (*Purohita*). Type locality: Ceylon.

分布: ?南西諸島; 東洋区, ポリネシア. **Distribution:** ?Ryukyu Islands; Oriental Region, Polynesia.

taiwanensis Muir, 1914 タイワンヒゲブトウンカ

Muir, 1914, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 53 (*Purohita*). Type locality: Horisha, Formosa.

分布: 九州, 沖縄(沖縄本島), 大東(南大東島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国, 東洋区, ミクロネシア. **Distribution:** Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region, Micronesia.

Genus *Tropidocephala* Stål, 1853

brunnipennis Signoret, 1860 コブウンカ

Signoret, 1860, *Ann. Soc. entomol. Fr.*, **3**: 185 (*Tropidocephala*). Type locality: Mayotte (near Madagascar).

= *graminea* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 259 (*Conicoda*). Type locality: Japan (Akashi und Gifu).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 台湾, 中国, 東洋区, オーストラリア, アフリカ.

Distribution: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan, China, Oriental Region, Australia, Africa.

festiva (Distant, 1906) ヒメコブウンカ

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhynch.*, **3**: 478 (*Smara*). Type locality: Ceylon; Pundaluova.

分布: 本州, 四国, 九州, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

nigra (Matsumura, 1900) クロコブウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 260 (*Conicoda*). Type locality: Japan (Akashi).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島, 久場島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 台湾, 中国.

Distribution: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan, China.

Genus *Altekon* Fennah, 1975

nigriella (Ishihara, 1954) ヒメクロウンカ

Ishihara, 1954, *Ins. Mats.*, **18**: 113 (*Delphacodes*). Type locality: Magome, Satsuma, Kyushu.

分布: ?本州, 九州, 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島, 来間島), 八重山(石垣島, 西表島).

Distribution: ?Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands.

Genus *Calligypona* Sahlberg, 1871

reyi (Fieber, 1866) キエリウンカ

Fieber, 1866, *Verh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, **16**: 527 (*Delphax*). Type locality: südlichen Frankreich (S. France).

分布: 本州; 中国, 極東ロシア, モンゴル, 旧北区. **Distribution:** Honshu; China, Russian Far East, Mongolia, Palaearctic Region.

Genus *Cemus* Fennah, 1964

nigroclyeatus (Kuoh, 1982) ゴマフウンカ

Kuoh, 1982, *Acta entomol. Sin.*, **25**: 72 (*Peliades*). Type locality: Shaanxi.

= *nigropunctatus*: Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 75 (*Phyllodinus*) (not Motschulsky, 1863).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); ?台湾,

韓国, 中国. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; ?Taiwan, Korean Peninsula, China.

sauteri (Muir, 1917) クロモンヒラアシウンカ

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 319 (*Phyllodinus*). Type locality: Formosa, Daimokko.

= *nigromaculosus*: Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 76 (*Phyllodinus*) (not Muir, 1917).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

Genus *Changeondelphax* Kwon, 1982

velitchkovskiyi (Melichar, 1913) サツポロウンカ

Melichar, 1913, *Faun. Dist. Walouyki Gov. Woronege (Russie)*, **7**: 6 (*Euidella*). Type locality: Russia.

= *sapporonis* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 78 (*Toya*). Type locality: Hokkaido; Sapporo.

分布: 北海道, 本州, 九州; 韓国, 中国, 極東ロシア, カザフスタン. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Kazakhstan.

Genus *Chloriona* Fieber, 1866

arakawai Matsumura, 1935

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 136 (*Chloriona*). Type locality: Shikoku; Sukumo (Tosa).

分布: 四国; 中国. **Distribution:** Shikoku; China.

japonica Matsumura, 1917 ヨシウンカ

Matsumura, 1917, *Appl. Entomol.*, **1**: 382 (*Chloriona*). Type locality: Japan.

分布: 北海道, 本州, 九州, 対馬. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Kyushu, Tsushima Island.

shikokuana Matsumura, 1935 シコクヨシウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 137 (*Chloriona*). Type locality: Honshu, Shikoku; Tateyama (Honshu) and Sukumo (Tosa).

= *sukumonis* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 138 (*Chloriona*). Type locality: Shikoku; Sukumo.

分布: 本州, 四国, 九州. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu.

tateyamana Matsumura, 1935 タテヤマヨシウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 138 (*Chloriona*). Type locality: Honshu; Tateyama.

分布: 本州, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア, アルタイ, モンゴル, カザフスタン. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Altai, Mongolia, Kazakhstan.

tosaensis Matsumura, 1935 トサヨシウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 137 (*Chloriona*). Type locality: Shikoku; Sukumo (Tosa).

分布: 四国. **Distribution:** Shikoku.

Genus *Coracodelphax* Vilbaste, 1968

obscurus Vilbaste, 1968

Vilbaste, 1968, *Über die Zikadenfauna des Primorje Gebietes*: 22 (*Coracodelphax*). Type locality: Primorsky kray.

分布: 本州; 中国, 北朝鮮, 極東ロシア. **Distribution:** Honshu; China, Korean Peninsula, Russian Far East.

Genus *Cotoya* Anufriev, 1977

galiae Anufriev, 1977

Anufriev, 1977, *Zool. Zhur.*, **56**: 865 (*Cotoya*). Type locality: Kunashir.

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州; 極東ロシア. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu; Russian Far East.

Genus *Criomorphus* Curtis, 1833

inconspicuus (Uhler, 1877)

Uhler, 1877, *Bull. U. S. Geol. Geog. Surv. Terr.*, **3** (2): 458 (*Stiroma*). Type locality: Colorado.

= *wilhelmi* Anufriev et Averkin, 1982, *Ins. Mongolica*, **8**: 131 (*Criomorphus*). Type locality: Kuril, Shikotan, Bay Church.
分布: 色丹島, 北海道; 極東ロシア, アメリカ. **Distribution**: Hokkaido; Russian Far East, USA.

Genus *Delphax* Fabricius, 1798

maritimus Anufriev, 1977 ヒゲブトウンカ

Anufriev, 1977, *Zool. Zhur.*, **56**: 859 (*Delphax*). Type locality: Primorsky kray, Jakovlevka.
分布: 北海道, 本州; 中国, 極東ロシア, モンゴル. **Distribution**: Hokkaido, Honshu; China, Russian Far East, Mongolia.

Genus *Diodelphax* Yang, 1989

obstipus Yang, 1989

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 311 (*Diodelphax*). Type locality: Pingtung, Pingtung Hsien.
分布: 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Ecdelphax* Yang, 1989

cervinus (Muir, 1917)

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 318 (*Dicranotropis*). Type locality: Luzon, Los Banos.
分布: 本州, 沖縄(沖縄本島); 台湾, 中国, フィリピン. **Distribution**: Honshu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Philippines.

dentatus Yang, 1989 チガヤチャイロウンカ

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 140 (*Ecdelphax*). Type locality: Chaipaotai, Taichung Hsien.
分布: 本州, 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(西表島); 台湾. **Distribution**: Honshu, Ryukyu Islands; Taiwan.

tortilis (Kuoh, 1982) スジグロウンカ

Kuoh, 1982, *Acta entomol. Sin.*, **25**: 71 (*Dicranotropis*). Type locality: 広西桂林 Kwangxi.
分布: 本州; 中国. **Distribution**: Honshu; China.

Genus *Elachodelphax* Vilbaste, 1965

metcalfi (Kusnezov, 1929)

Kusnezov, 1929, *Wien. entomol. Ztg.*, **46**: 163 (*Liburnia*). Type locality: Selenginskii Rayon, Bargoi-Steppe (Transbaikal).
分布: 北海道, 本州; シベリア東部, モンゴル, 中国. **Distribution**: Hokkaido, Honshu; E. Siberia, Mongolia, China.

Genus *Epunka* Matsumura, 1935

bilineata Matsumura, 1935 フタスジオオウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 77 (*Epunka*). Type locality: Hokkaido; Sapporo.
分布: 北海道, 本州, 九州, 対馬. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Kyushu, Tsushima Island.

Genus *Euconomelus* Haupt, 1929

lepidus (Boheman, 1847) アシマダラウンカ

Boheman, 1847, *Handl. Kongl. Svensk. Vet. Akad.*, **3**: 39 (*Delphax*). Type locality: Sverige (Sweden).
分布: 北海道, 本州; 中国, ロシア, アルタイ, モンゴル, 旧北区. **Distribution**: Hokkaido, Honshu; China, Russia, Altai, Mongolia, Palaeartic Region.

Genus *Euides* Fieber, 1866

basilinea (Germar, 1821) クロスジオオウンカ

Germar, 1821, *Mag. Entomol.*, **4**: 105 (*Delphax*). Type locality: Tauria Steven.
= *speciosa* Boheman, 1845, *Öfvers. Kongl. Vet.-Akad. Förh.*, **2**: 163 (*Delphax*). Type locality: Insula Wermdö.

分布:北海道, 本州, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 旧北区. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Palearctic Region.

Genus *Falcotoya* Fennah, 1969

lyraeformis (Matsumura, 1900) タテゴトウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 267 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu).

分布:本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 太平洋地域. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Pacific Islands.

Genus *Garaga* Anufriev, 1977

nagaragawana (Matsumura, 1900) ナガラガワウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 265 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu an den niederen Pflanzen der Küste Nagaragawa).

= *esakii* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 71 (*Dicranotropis*). Type locality: Kyushu: Fukuoka. エサキウンカ.

= *sinensis*: Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 73 (*Perkinsiella*) (not Kirkaldy, 1907).

分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア, 台湾, 中国. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East, Taiwan, China.

orchidensis Yang, 1989

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 49 (*Garaga*). Type locality: Orchid Is., Taitung Hsien.

分布:八重山(西表島); 台湾. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Hagamiodes* Fennah, 1975

fuscicaudatus (Muir, 1917) チクゼンウンカ

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 318 (*Dicranotropis*). Type locality: Luzon, Los Baños.

= *tikuzenensis* Matsumura et Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 67 (*Dicranotropis*). Type locality: Japan, Kyushu (Tikuzen). チクゼンウンカ.

分布:本州, 四国, 九州; 中国, フィリピン. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu; China, Philippines.

Genus *Harmalia* Fennah, 1969

anacharsis Fennah, 1969 ウスイロシロカタウンカ

Fennah, 1969, *Pacif. Ins. Monogr.*, **21**: 38 (*Harmalia*). Type locality: New Caledonia, Poindimié.

= *cordata* Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 210 (*Harmalia*). Type locality: Taiwan; Puli, Nantou Hsien.

分布:奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(西表島); 台湾, フィリピン, タイ, バングラデシュ, ジャワ島. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Thailand, Bangladesh, Java.

brunnia (Muir, 1917) キガオシロカタウンカ

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 328 (*Sardia*). Type locality: Amboina; Luzon, Los Baños.

= *commelinae* Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 206 (*Harmalia*). Type locality: Taiwan; Chiasien, Kaohsiung Hsien.

分布:八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, フィリピン, アンボン. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Ambon.

heitensis (Matsumura et Ishihara, 1945) タイワンシロカタウンカ

Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 66 (*Sogata*). Type locality: Taiwan, Pingtung.

分布:奄美(徳之島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, フィリピン, ベトナム, スリランカ. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Vietnam, Sri Lanka.

sirokata (Matsumura et Ishihara, 1945) シロカタウンカ

Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 64 (*Paracorbulo*). Type locality: Japan, Fukuoka.

分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 極東ロシア, 韓国, 中国, 台湾. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Russian Far East, Korean Peninsula, China, Taiwan.

Genus *Himeunka* Matsumura et Ishihara, 1945

tateyamaella (Matsumura, 1935) ヒメウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 135 (*Unkana*). Type locality: Honshu and Kiushu; Tateyama, Kushi (Kagoshima).
= *kushiana* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 72 (*Unkana*). Type locality: Kiushu; Kushi near Kagoshima.
= *semicirculara* Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 196 (*Sogatellana*). Type locality: Nanjenshan, Pingtung Hsien. カモノハシウンカ.

分布: 本州, 九州, 対馬, 奄美 (奄美大島, 喜界島, 沖永良部島), 沖縄 (沖縄本島, 久米島), 宮古 (宮古島), 八重山 (石垣島, 竹富島, 西表島); 中国, 台湾, 韓国. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; China, Taiwan, Korean Peninsula.

Genus *Hirozuunka* Matsumura et Ishihara, 1945

japonica Matsumura et Ishihara, 1945 ヒロズウンカ

Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 74 (*Hirozuunka*). Type locality: Japan, Oita.

分布: 本州, 九州, 八重山 (西表島); 韓国, 中国. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China.

Genus *Horcoma* Fennah, 1969

colorata (Motschulsky, 1863)

Motschulsky, 1863, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, **36**: 110 (*Delphax*). Type locality: environs de Colombo (Ceylon).
subsp. *lacteipennis* (Muir, 1917)

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 337 (*Delphacodes lacteipennis*). Type locality: Fiji, Java, Formosa.

分布: 八重山 (西表島); 台湾, 中国, 太平洋地域, 東洋区. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, China, Pacific Islands, Oriental Region.

Genus *Ishiharodelphax* Kwon, 1982

matsuyamensis (Ishihara, 1952) チビウンカ

Ishihara, 1952, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (8): 44 (*Delphacodes*). Type locality: Iwazaki, Matsuyama, Shikoku.

= *exigua*: Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 61 (*Delphacodes*) (not Boheman, 1847).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美 (奄美大島), 沖縄 (沖縄本島), 八重山 (石垣島, 西表島); 韓国, 中国. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China.

Genus *Javesella* Fennah, 1963

dubia (Kirschbaum, 1868)

Kirschbaum, 1868, *Jahrb. Nassau. Ver. Naturk.*, **21**: 26 (*Delphax*). Type locality: Frankfurt, Soden Enkheim.

分布: 北海道; 中国, 極東ロシア, 旧北区. **Distribution:** Hokkaido; China, Russian Far East, Palearctic Region.

pellucida (Fabricius, 1794) キタウンカ

Fabricius, 1794, *Entomol. Syst.*, **4**: 7 (*Fulgora*). Type locality: Halae Saxonum.

分布: 北海道, 本州; ロシア, モンゴル, 旧北区, 北アメリカ, 中央アメリカ. **Distribution:** Hokkaido, Honshu; Russia, Mongolia, Palearctic Region, USA.

Genus *Kakuna* Matsumura, 1935

kuwayamai Matsumura, 1935 クワヤマウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 76 (*Kakuna*). Type locality: Japan, Sapporo.

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 沖縄 (沖縄本島), 八重山 (石垣島); 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

pectinata Anufriev, 1977 ハゲロウンカ

Anufriev, 1977, *Zool. Zhur.*, **56**: 862 (*Kakuna*). Type locality: Kunashir.

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州; 極東ロシア. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu; Russian Far East.

Genus *Kartalia* Koçak, 1981

nipponica (Matsumura et Ishihara, 1945) ニホンウンカ

Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 72 (*Zuleika*). Type locality: Honshu, Osaka.

分布: 本州, 九州; 中国. **Distribution:** Honshu, Kyushu; China.

Genus *Laodelphax* Fennah, 1963

striatellus (Fallén, 1826) ヒメトビウンカ

Fallén, 1826, *Hem. Sveiae*, **2**: 75 (*Delphax*). Type locality: Sverige (Sweden).

= *nipponica* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 262 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Sapporo).

= *devastans* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 262 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Sapporo, Niigata).

= *minoensis* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 263 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu).

= *giffuensis* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 264 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu).

= *akashiensis* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 266 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Akashi).

= *maikoensis* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 266 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Akashi, Gifu).

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(種子島), トカラ(横当島), 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 中国, 極東ロシア, 旧北区, 東洋区. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Palaearctic Region, Oriental Region.

Genus *Laoterthrona* Ding et Huang, 1980

nigrigena (Matsumura et Ishihara, 1945) ホオグロウンカ

Matsumura & Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 62 (*Delphacodes*). Type locality: Kyushu, Tikuzen.

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州; 韓国, 中国. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, China.

testacea Ding et Tian, 1980 トダシバウンカ

Ding & Tian, 1980, *Acta zootaxon. Sin.*, **5**: 300 (*Laoterthrona*). Type locality: China; Jiangsu, Jiangpu.

分布: 本州; 中国. **Distribution:** Honshu; China.

Genus *Latistria* Huang et Ding, 1980

eupompe (Kirkaldy, 1907)

Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 162 (*Delphax*). Type locality: Australia; New South Wales, Queensland; Fiji: Suva.

分布: 沖縄(沖縄本島, 久米島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, フィリピン, 太平洋地域, オーストラリア. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Pacific Islands, Australia.

Genus *Matsumuramata* Xing et Chen, 2014

corporaali (Muir, 1923) チガヤシロウンカ

Muir, 1923, *Philip. J. Sci.*, **22**: 173 (*Dicranotropis*). Type locality: Sumatra, Medan.

分布: 本州, 九州, 八重山(西表島); 台湾, 中国, ベトナム, スマトラ. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Vietnam, Sumatra.

muiri (Kirkaldy, 1907) ウスイロウンカ

Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 134 (*Dicranotropis*). Type locality: China: Wei Chou.

= *sacchari* Matsumura, 1910, *Die schädlichen und Nützlichen insekten vom Zuckerrohr Formosas*, **10**: 16 (*Stenocranus*). Type locality: Formosa (Akô, Rinkihô). サトウナガウンカ.

= *sakaguchii* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 73 (*Unkana*). Type locality: Okinawa, Naha.

分布:大隅(種子島, 屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島, 多良間島), 八重山(石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 台湾, 中国, 東洋区, アフリカ. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region, Africa.

Genus *Matutinus* Distant, 1917

melichari (Kirkaldy, 1906) クロモントガリウンカ

Kirkaldy, 1906, *Can. Entomol.*, **38**: 156 (*Delphacodes*). Replacement name for *Liburnia fumipennis* Melichar, 1903. = *fumipennis* Melichar, 1903, *Homopteren-fauna von Ceylon*: 97 (*Liburnia*). Type locality: Ceylon; Henaratgoda, Peradeniya. Junior homonym of *Liburnia fumipennis* Fieber, 1866.

= *yanchinus* Kuoh, 1980, *Acta entomol. Sin.*, **23**: 197 (*Matutinus*). Type locality: Hainan.

分布: 奄美(徳之島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国, 東洋区.

Distribution: Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

typhae (Lindberg, 1960)

Lindberg, 1960, *Comm. Biol.*, **22**: 18 (*Calligypona*). Type locality: Canary Is. (Valle de Fataga).

分布: 奄美(徳之島), 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); カナリア諸島. **Distribution:** Ryukyu Islands; Canaries.

Genus *Megamelus* Fieber, 1866

flavus Crawford, 1914 オゼウンカ

Crawford, 1914, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **46**: 609 (var. of *Megamelus notula*). Type locality: Colorado.

= *notula*: Ishihara, 1952, *Ins. Mats.*, **18**: 37 (*Megamelus*) (not Germar, 1830).

分布: 北海道, 本州; ロシア, カナダ, アメリカ. **Distribution:** Hokkaido, Honshu; Russia, Canada, USA.

Genus *Metadelphax* Wagner, 1963

propinquus (Fieber, 1866) シロウズウンカ

Fieber, 1866, *Verh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, **16**: 525 (*Delphax*). Type locality: Italia, Trieste; Spain, Malaga; Austria.

= *shirozui* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, **2**: 53 (*Delphacodes*). Type locality: Minami-Oita, N.W. Kyushu.

分布: 北海道, 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島, 多良間島), 八重山(石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 全世界. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; worldwide.

Genus *Monospinodelphax* Ding, 2006

dantur (Kuoh, 1980) ミスジウンカ

Kuoh, 1980, *Acta entomol. Sin.*, **23**: 195 (*Indozurriel*). Type locality: China, Hubei.

分布: 本州; 中国, 台湾. **Distribution:** Honshu; China, Taiwan.

Genus *Muellerianella* Wagner, 1963

extrusa (Scott, 1871) ナカノウンカ

Scott, 1871, *Entomol. mon. Mag.*, **7**: 194 (*Liburnia*). Type locality: Wimbledon.

分布: 北海道, 本州, 九州, 対馬; 台湾, 中国, 極東ロシア, 旧北区. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Taiwan, China, Russian Far East, Palaeartic Region.

Genus *Nilaparvata* Distant, 1906

bakeri (Muir, 1917) トビイロウンカモドキ

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 336 (*Delphacodes*). Type locality: Los Banos, Luzon, P.I.

分布: 本州, 四国, 九州, 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 台湾, 中国, 東洋区.

Distribution: Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan, China, Oriental Region.

lugens (Stål, 1854) トビイロウンカ

Stål, 1854, *Öfv. Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Förh.*, **11**: 246 (*Delphax*). Type locality: Java.

= *oryzae* Matsumura, 1910, *Inj. Ins. Japan (Dainippon Gaichu Zensho)*, **1**: 115 (*Delphax*). Type locality: Japan.

分布: 北海道, 本州, 伊豆諸島, 四国, 九州, 対馬, 大隅(種子島, 屋久島), 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 中国, 極東ロシア, 東洋区, オーストラリア. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Izu Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Oriental Region, Australia.

muri China, 1925 ニセトビイロウンカ

China, 1925, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (9) **16**: 480 (*Nilaparvata?*). Type locality: Chungso, 7200 feet (Yunnan).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 台湾, 中国, ベトナム. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Taiwan, China, Vietnam.

Genus *Nycheuma* Fennah, 1964

cognatum (Muir, 1917)

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 317 (*Dicranotropis*). Type locality: Queensland, Cairns and Brisbane; Fiji, Rewa; Luzon, P.I., Benguet, Baguio, Mount Benahao.

分布: 小笠原諸島, 八重山(西表島); 台湾, 中国, フィリピン, インドネシア, ポリネシア. **Distribution**: Ogasawara Islands, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Philippines, Indonesia, Polynesia.

Genus *Onidodelphax* Yang, 1989

serratus Yang, 1989

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 155 (*Onidodelphax*). Type locality: Tsaoliing, Yunlin Hsien.

分布: 沖縄(沖縄本島); 台湾, 中国. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Genus *Opiconsiva* Distant, 1917

albicollis (Motschulsky, 1863) サメシマウンカ

Motschulsky, 1863, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, **36**: 110 (*Delphax*). Type locality: environs de Colombo (Ceylon).

= *sameshimai* Matsumura et Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 68 (*Kakuna*). Type locality: Japan: Kyushu (Fukuoka).

= *yanoi* Ishihara, 1952, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (8): 42 (*Sogata*). Type locality: Dogo, Matsuyama, Shikoku.

分布: 本州, 佐渡島, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 極東ロシア, 中国, 台湾, 東洋区, トルコ, パレスチナ, エジプト, カナリア諸島, マダガスカル.

Distribution: Honshu, Sado Island, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Russian Far East, China, Taiwan, Oriental Region, Turkey, Palestine, Egypt, Canaries, Madagascar.

tangira (Matsumura, 1910)

Matsumura, 1910, *J. Col. Sci. Imp. Univ. Tokyo*, **27**: 30 (*Delphax*). Type locality: Morocco.

分布: 八重山(西表島); 中国, バングラデシュ, インド, スリランカ, パレスチナ, イタリア, モロッコ, 新熱帯区. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Bangladesh, India, Sri Lanka, Palestine, Italy, Morocco, Afrotropical Region.

Genus *Orientoya* Chen et Ding, 2001

orientalis Chen et Ding, 2001

Chen & Ding, 2001, *Acta zootaxon. Sin.*, **26**: 331 (*Orientoya*). Type locality: China, Guizhou.

分布: 本州; 中国. **Distribution**: Honshu; China.

Genus *Paraconon* Yang, 1989

membranacea Yang, 1989

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 109 (*Paraconon*). Type locality: Henchun, Pingtung Hsien.

分布: 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Paradelphacodes* Wagner, 1963

paludosus (Flor, 1861) エゾトビウンカ

Flor, 1861, *Archiv Naturk. Liv- Ehst- & Kurland*, **2**: 82 (*Delphax*). Type locality: Livland.
= *yezoana* Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 265 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Sapporo).
= *agropyri* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 55 (*Delphacodes*). Type locality: Unebimachi, Takaichigun, Nara Pref., Honshu. カモジグサウンカ.
= *kuwaharai* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 58 (*Delphacodes*). Type locality: Honshu; Unebimachi, Takaichigun, Nara Pref. クワハラウンカ.
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア, アルタイ, モンゴル, 旧北区, アラスカ. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Altai, Mongolia, Palaearctic Region, Alaska.

tengaicus Vilbaste, 1965 イチタトビウンカ

Vilbaste, 1965, *Über die Zikadenfauna Altai*: 18 (*Paradelphacodes*). Type locality: Altai, Tenga.
分布: 北海道; 極東ロシア, アルタイ, モンゴル, トランスバイカル地域. **Distribution**: Hokkaido; Russian Far East, Altai, Mongolia, Transbaikal.

Genus *Paradelphax* Vilbaste, 1980

atratus (Vilbaste, 1968)

Vilbaste, 1968, *Über die Zikadenfauna des Primorje Gebietes*: 32 (*Paradelphax*). Type locality: Primorsky kray.
分布: 北海道; ロシア, 韓国, 中国. **Distribution**: Hokkaido; Russian Far East, Korean Peninsula, China.

Genus *Peliades* Jacobi, 1928

chuhkouensis Yang, 1989 オオクロヒラアシウンカ

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 121 (*Peliades*). Type locality: Chuhkou, Chiayi Hsien.
分布: 八重山(西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Peregrinus* Kirkaldy, 1904

maidis (Ashmead, 1890) トウモロコシウンカ

Ashmead, 1890, *Psyche*, **5**: 323 (*Delphax*). Type locality: USA, Florida.
分布: 小笠原諸島, 九州(福岡県), 奄美(奄美大島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島), 大東(南大東島), 八重山(石垣島, 西表島); 世界の熱帯・亜熱帯. **Distribution**: Ogasawara Islands, Kyushu, Ryukyu Islands; pan-tropics.

Genus *Perkinsiella* Kirkaldy, 1903

bakeri Muir, 1916 クロウシウンカ

Muir, 1916, *Philip. J. Sci.*, **11**: 379 (*Perkinsiella*). Type locality: Luzon, Laguna, Los Baños.
分布: 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(西表島); 台湾, 中国, ベトナム, フィリピン, パラオ.
Distribution: Ryukyu Islands; Taiwan, China, Vietnam, Philippines, Palau.

bigemina Ding, 1980

Ding, 1980, *J. Nanjing agr. Col.*, **1**: 108 (*Perkinsiella*). Type locality: China (Guangdong).
分布: 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島); 中国, 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Taiwan.

graminicida Kirkaldy, 1906 チャイロウシウンカ

Kirkaldy, 1906, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (1): 406 (*Perkinsiella*). Type locality: Australia: Queensland.
分布: 奄美(奄美大島, 徳之島), 八重山(西表島); オーストラリア. **Distribution**: Ryukyu Islands; Australia.

saccharicida Kirkaldy, 1903 クロフツノウシウンカ (サトウノウシウンカ)

Kirkaldy, 1903, *Entomologist*, **36**: 179 (*Perkinsiella*). Type locality: Hawaii Isles; Oahu, Honolulu.
分布: 小笠原諸島, 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 久米島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島, 多良間島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 東洋区, アフリカ, ハワイ. **Distribution**: Ogasawara Islands, Ryukyu Islands; Oriental Region, Africa, Hawaiian Islands.

sinensis Kirkaldy, 1907 ウシウンカ

Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 138 (*Perkinsiella*). Type locality: China, Wei Chou.

= *yakushimensis* Ishihara, 1954, *Ins. Mats.*, **18**: 111 (*Perkinsiella*). Type locality: Japan: Yakushima. ヤクシマウシウンカ.

分布: 本州, 九州, 大隅(種子島, 屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

Genus *Prodelphax* Yang, 1989

formosanus Yang, 1989 タイワンセスジウンカ

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 40 (*Prodelphax*). Type locality: Kukuan, Taichung Hsien.

分布: 本州, 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島); 台湾. **Distribution**: Honshu, Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Pseudosogata* Ding, 2006

vatrenus (Fennah, 1975)

Fennah, 1975, *Entomol. Scand.*, **4**: 100 (*Sogata*). Type locality: Ceylon (Polonnaruwa).

分布: 奄美(奄美大島); 中国, スリランカ. **Distribution**: Ryukyu Islands; China, Sri Lanka.

Genus *Rhombotoya* Fennah, 1975

pseudonigripennis (Muir, 1918)

Muir, 1918, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 427 (*Delphacodes*). Replacement name for *Delphacodes nigripennis* Muir, 1917.

= *nigripennis* Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 338 (*Delphacodes*). Type locality: Formosa, Daimokko. Junior homonym of *Delphacodes nigripennis* Crawford, 1914.

分布: 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(西表島); 台湾, 中国. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Genus *Ribautodelphax* Wagner, 1963

collinus (Boheman, 1947) クロヒゲウンカ

Boheman, 1947, *Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl.*, **3**: 51 (*Delphax*). Type locality: Sverige (Sweden).

分布: 本州; 旧北区. **Distribution**: Honshu; Palearctic Region.

Genus *Sardia* Melichar, 1903

rostrata Melichar, 1903 ヤリウンカ

Melichar, 1903, *Homopteren-fauna von Ceylon*: 96 (*Sardia*). Type locality: Henaratgoda.

= *pluto* Kirkaldy, 1906, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (1): 410 (*Hadeodelphax*). Type locality: Queensland, Cairns.

分布: 本州, 小笠原諸島, 九州, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(西表島); 台湾, 中国, 東洋区, オーストラリア, 中東, アフリカ. **Distribution**: Honshu, Ogasawara Islands, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region, Australia, Middle East, Africa.

Genus *Sinoperkinsiella* Ding, 1983

sacciolepis Ding, 1983

Ding, 1983, *Acta entomol. Sin.*, **26**: 327 (*Sinoperkinsiella*). Type locality: China (Guangxi).

分布: 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 中国. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Genus *Sogata* Distant, 1906

hakonensis (Matsumura, 1935) ハコネホソウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 133 (*Unkana*). Type locality: Hokkaido and Honshu; Sapporo, Gifu, Takasago, Hakone, Moji, Mt. Amagi.

= *akashiensis* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 127 (*Stenocranus*). Type locality: Honshu (Akashi, Gifu, Kamakura, Ogikubo (Tokyo)). アカシナガウンカ.

= *ogasawarensis* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **9**: 130 (*Stenocranus*). Type locality: Bonin Islands.

分布: 北海道, 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 座間味島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan.

nigrifrons (Muir, 1917)

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 322 (*Stenocranus*). Type locality: Formosa, Kanshirai.

分布: 沖縄(沖縄本島, 久米島); 台湾, 中国. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, China.

testacea (Matsumura, 1900) トビイロホソウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 257 (*Chlorionidea*). Type locality: Japan (Akashi, Gifu).

分布: 本州. **Distribution:** Honshu.

Genus **Sogatella** Fennah, 1956

furcifera (Horváth, 1899) セジロウンカ

Horváth, 1899, *Természetr. Füz.*, **22**: 372 (*Delphax*). Type locality: Île de Yesso (Japan).

= *kyusyuensis* Matsumura et Ishihara, 1945, *Mushi*, **16**: 65 (*Sogata*). Type locality: Kyushu, Fukuoka. キュウシュウウンカ.

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州, 伊豆諸島, 四国, 九州, 対馬, 大隅(種子島, 屋久島, 口永良部島), トカラ列島, 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 伊是名島, 久米島), 慶良間(渡嘉敷島, 座間味島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 中国, 極東ロシア, モンゴル, 東洋区. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Izu Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Mongolia, Oriental Region.

kolophon (Kirkaldy, 1907) セジロウンカモドキ

Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 157 (*Delphax*). Type locality: Queensland, Redlynch, Cairns, Kuranda.

= *elegantissima* Ishihara, 1952, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (8): 45 (*Delphacodes*). Type locality: Dogo, Matsuyama, Shikoku.

分布: 北海道, 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島, 多良間島), 八重山(石垣島); 韓国, 中国, 東洋区, ミクロネシア, オーストラリア区, エチオピア区, 新北区, 新熱帯区. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Oriental Region, Micronesia, Australian Region, Afrotropical Region, New World.

vibix (Haupt, 1927) ヒエウンカ

Haupt, 1927, *Bull. Palestine agr. Exp. Sta.*, **8**: 13 (*Liburnia*). Type locality: Palästina.

= *longifurcifera* Esaki et Ishihara, 1947, *Mushi*, **17**: 41 (*Delphacodes*). Type locality: Kyushu, Fukuoka.

= *panicola* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 51 (*Delphacodes*). Type locality: Unebimachi, Takaichigun, Nara Pref., Honshu.

= *dogensis* Ishihara, 1952, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (8): 47 (*Delphacodes*). Type locality: Dogo, Matsuyama, Shikoku.

分布: 北海道, 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 中国, 極東ロシア, モンゴル, ミクロネシア, 旧北区, 東洋区, オーストラリア区. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Mongolia, Micronesia, Palaearctic Region, Oriental Region, Australian Region, Afrotropical Region.

Genus **Syndelphax** Fennah, 1963

disonymos (Kirkaldy, 1907)

Kirkaldy, 1907, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (3): 156 (*Delphax*). Type locality: Fiji, Rewa, Suva.
分布: 大東(北大東島, 南大東島); 台湾, 中国, 太平洋地域, 東洋区, アフリカ. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, China, Pacific Islands, Oriental Region, Africa.

Genus *Tagosodes* Asche et Wilson, 1990

pusanus (Distant, 1912)

Distant, 1912, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (8) 9: 191 (*Sogata*). Type locality: Bengal; Pusa, Calcutta; Berhampur, Murshidabad District.
=*formosella* Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, 10: 72 (*Unkana*). Type locality: Formosa; Heito.
分布: ?九州, 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution:** ?Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

Genus *Tarophagus* Zimmerman, 1948

colocasiae (Matsumura, 1920) タロイモウンカ

Matsumura, 1920, *Inj. Ins. Japan (Dainippon Gaichu Zensho)*, 1: 264 (*Liburnia (Delphax)*). Type locality: Formosa.
分布: 沖縄(沖縄本島), 大東(南大東島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, ミクロネシア, 東洋区.
Distribution: Ryukyu Islands; Taiwan, Micronesia, Oriental Region.

Genus *Terthron* Fennah, 1965

albovittatum (Matsumura, 1900) セスジウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, 26: 269 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu an niederen Pflanzen).
=*fukuokae* Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 57 (*Delphacodes*). Type locality: Hirao, Fukuoka, Kyushu. フクオカウンカ.
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(慶留間島, 阿嘉島, 久場島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 中国, 韓国, 東洋区. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Korean Peninsula, Oriental Region.

Genus *Terthronella* Vilbaste, 1968

basalis (Matsumura, 1915)

Matsumura, 1915, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, 5: 178 (*Liburnia (Delphax)*). Type locality: Korea (der Berg Kongo).
分布: 本州(長野県); 韓国, 中国, 極東ロシア, モンゴル, カザフスタン. **Distribution:** Honshu; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Mongolia, Kazakhstan.

Genus *Toya* Distant, 1906

bridwelli (Muir, 1920)

Muir, 1920, *Bull. entomol. Res.*, 10: 140 (*Delphacodes*). Type locality: Nigeria (Oloke-Meji).
分布: 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾, 東洋区, アフリカ. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region, Africa.

terryi (Muir, 1917) ハイキビウンカ

Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, 3: 334 (*Delphacodes*). Type locality: Java, Dieng Plateau, 7,000ft; Formosa.
=*tuberculosa*: Fennah, 1975, *Entomol. Scand.*, Suppl. 4: 117 (*Toya*) (not Distant, 1916).
分布: 本州, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(西表島); 韓国, 台湾, 中国, ジャワ島. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan, China, Java.

Genus *Ulanar* Fennah, 1975

muiri (Metcalf, 1943)

Metcalf, 1943, *Gen. Cat. Hem.*, 4 (3): 209 (*Megamelus*). Replacement name for *Megamelus albicollis* Muir, 1917.

= *albicollis* Muir, 1917, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 327 (*Megamelus*). Type locality: Luzon, Mount Benahao. Junior homonym of *Megamelus albicollis* Crawford, 1914.
= *centesima* Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 261 (*Ulanar*). Type locality: Taichung.
分布: 宮古(宮古島), 八重山(西表島); 台湾, 中国, フィリピン, 東洋区. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China, Philippines, Oriental Region.

Genus *Unkanodella* Vilbaste, 1968

ussuriensis Vilbaste, 1968

Vilbaste, 1968, *Über die Zikadenfauna des Primorje Gebietes*: 27 (*Unkanodella*). Type locality: Promorsky kray.
分布: 本州; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Honshu; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

Genus *Unkanodes* Fennah, 1956

(Subgenus *Kwonianella* Anufriev et Emeljanov, 1988)

albifascia (Matsumura, 1900) シロオビウンカ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 268 (*Liburnia*). Type locality: Japan (Gifu an niederen Pflanzen).
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

(Subgenus *Unkanodes* Fennah, 1956)

excisus (Melichar, 1898)

Melichar, 1898, *Wien. entomol. Ztg.*, **17**: 67 (*Liburnia*). Type locality: Schleswig-Holstein.
分布: 本州; 極東ロシア, 旧北区, アメリカ. **Distribution**: Honshu; Russian Far East, Palearctic Region, USA.

sapporonus (Matsumura, 1935) サツポロトビウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 74 (*Unkana*). Type locality: Hokkaido, Sapporo.
分布: 北海道, 本州, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 極東ロシア, 台湾. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

Genus *Wuyia* Ding, 1991

nigerrima (Ishihara, 1949) クロウンカ

Ishihara, 1949, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (2): 59 (*Delphacodes*). Type locality: Unebimachi, Nara Pref., Honshu.
分布: 本州; 中国. **Distribution**: Honshu; China.

Genus *Yangsinolacme* Ding, 2006

terrea (Yang, 1989)

Yang, 1989, *NSC spec. Publ.*, (6): 73 (*Sinolacme*). Type locality: Chiasien, Kaohsiung Hsien.
分布: 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Yanunka* Ishihara, 1952

miscanthi Ishihara, 1952 カヤウンカ

Ishihara, 1952, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (8): 39 (*Yanunka*). Type locality: Shikoku, Matsuyama.
分布: 本州(三重県, 広島県, 山口県), 四国, 九州, 対馬, 五島(福江島), トカラ(中之島), 奄美(奄美大島); 韓国, 中国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China.

Genus *Zhuangella* Ding, 2006

nanningensis Ding, 2006

Ding, 2006, *Faun. Sin. Ins.*, **45**: 362 (*Zhuangella*). Type locality: China; Nanning, Guangxi.
分布: 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島); 中国. **Distribution**: Ryukyu Islands; China.

Family Meenoplidae シマウンカ科

Genus *Eponisiella* Emeljanov, 1984

guttulinervis (Matsumura, 1914) シマウンカモドキ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 287 (*Eponisia*). Type locality: Honshu (Tokyo und Towada).
分布: 本州, 四国, 九州. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu.

Genus *Nisia* Melichar, 1903

grandiceps Kirkaldy, 1906 オオシマウンカ (改称)

Kirkaldy, 1906, *Bull. Exp. Sta. Haw. Sugar Pl. Assoc. Entomol. Ser.*, (1): 427 (*Nisia*). Type locality: Queensland, Kuranda and Cairns.

分布: 大東 (南大東島), 八重山 (石垣島, 西表島); オーストラリア, 太平洋地域. **Distribution**: Ryukyu Islands; Australia, Pacific Islands.

nervosa (Motschulsky, 1863) シマウンカ

Motschulsky, 1863, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, **36**: 114 (*Livilla?*). Type locality: environs de Colombo.
分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅 (屋久島), 奄美 (奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄 (沖縄本島, 久米島), 慶良間 (阿嘉島), 大東 (北大東島, 南大東島), 宮古 (宮古島, 伊良部島), 八重山 (石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 韓国, 中国, ロシア, 台湾, ミクロネシア, オーストラリア, 東洋区, エチオピア区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russia, Taiwan, Micronesia, Australia, Oriental Region, Ethiopian Region.

Family Fulgoridae ビワハゴロモ科

Genus *Lycorma* Stål, 1863

delicatula (White, 1845) シタバニハゴロモ

White, 1845, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (1) **15**: 37 (*Aphaena*). Type locality: China (Nankin).
分布: 本州; 韓国, 中国, 台湾. **Distribution**: Honshu; Korean Peninsula, China, Taiwan.

Family Derbidae ハネナガウンカ科

Subfamily *Zoraidinae* ハネナガウンカ亜科

Genus *Diostrombus* Uhler, 1896

politus Uhler, 1896 アカハネナガウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 284 (*Diostrombus*). Type locality: Japan.

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅 (屋久島), 奄美 (奄美大島, 徳之島), 沖縄 (沖縄本島), 八重山 (石垣島, 西表島); 韓国, 中国, 台湾. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan.

Genus *Helcita* Stål, 1856

shirakii Yang et Wu, 1994 ハマダラオオハネナガウンカ

Yang & Wu, 1994, *Derbidae of Taiwan*: 33 (*Helcita*). Type locality: Sansanrin (Taiwan).

分布: 奄美 (奄美大島), 沖縄 (沖縄本島), 八重山 (石垣島, 西表島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Losbanosia* Muir, 1917

hibarensis (Matsumura, 1935) アヤヘリハネナガウンカ

Matsumura, 1935, *Ins. Mats.*, **10**: 79 (*Nomuraida*). Type locality: Honshu, Lake Hibara in Pref. Fukushima.
分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美 (奄美大島); 韓国, 中国, 極東ロシア, 台湾. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

Genus *Pamendanga* Distant, 1906

matsumurae (Muir, 1918) マダラハネナガウンカ

Muir, 1918, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 422 (*Paraproutista*). Type locality: Hokkaido (Sapporo), Japan, and Formosa (Horisha).

= *rubilinea*: Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 297 (*Pamendanga*) (not Distant, 1906).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州; 韓国, 中国, 極東ロシア, 台湾, インド. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan, India.

Genus *Parapeggia* Yang et Wu, 1994

taiwana Yang et Wu, 1994

Yang & Wu, 1994, *Derbidae of Taiwan*: 35 (*Parapeggia*). Type locality: Chihpen, Taitung Hsien.

分布: 八重山 (石垣島, 西表島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Shirakiana* Metcalf, 1945

infumata (Matsumura, 1914) シラキハネナガウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 303 (*Shirakia*). Type locality: Formosa (Hoppono, Kanshirei, Shoka).

分布: 本州, 八重山 (西表島); 台湾, 韓国. **Distribution**: Honshu, Ryukyu Islands; Taiwan, Korean Peninsula.

Genus *Zoraida* Kirkaldy, 1900

albicans Anufriev, 1968 ウスマエグロハネナガウンカ

Anufriev, 1968, *Entomol. Obozr.*, **47**: 135 (*Zoraida*). Type locality: Primorsky kray.

分布: 本州, 九州; 韓国, 極東ロシア. **Distribution**: Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, Russian Far East.

horishana Matsumura, 1914 シリアカハネナガウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 302 (*Zoraida*). Type locality: Formosa (Horisha, Toroën, Kanshirei).

分布: 本州, 九州; 韓国, 中国, 極東ロシア, 台湾. **Distribution**: Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

kuwayamae (Matsumura, 1913) クワヤマハネナガウンカ

Matsumura, 1913, *Thous. Ins. Jap. Addit.*, **1**: 63 (*Thacia*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布: 北海道, 本州, 四国; 韓国. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku; Korean Peninsula.

pterophoroides (Westwood, 1851) マエグロハネナガウンカ

Westwood, 1851, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (2) **7**: 210 (*Derbe* (*Thracia*)). Type locality: Insula Ceylon.

分布: ?本州, ?九州; ?中国, ?極東ロシア, ?台湾, マレーシア, ミャンマー, スリランカ, インド.

Distribution: ?Honshu, ?Kyushu; ?China, ?Russian Far East, ?Taiwan, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, India.

Subfamily *Derbinae* ハネビロウンカ亜科

Genus *Cedusa* Fowler, 1904

tamagawana (Matsumura, 1914) タマガワセダカハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 291 (*Lamenia*). Type locality: Honshu (Tamagawa bei Tokyo).

分布: 本州, 対馬. **Distribution**: Honshu, Tsushima Island.

Genus *Kamendaka* Distant, 1906

saccharivora (Matsumura, 1910) サトウマダラハネビロウンカ

Matsumura, 1910, *Die schädlichen und nützlichen Insekten vom Zuckerrohr Formosas*: 13 (*Nicertoides*).

Type locality: Akō, Wanri, Shōka, Giran.

分布:本州,九州,対馬,大隅(屋久島),奄美(奄美大島,喜界島,徳之島,沖永良部島),沖縄(沖縄本島,久米島),慶良間(渡嘉敷島),宮古(宮古島),八重山(石垣島,西表島,与那国島);台湾.
Distribution: Honshu, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Mysidioides* Matsumura, 1905

sapporensis (Matsumura, 1900) クロフハネビロウンカ(改称)

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 209 (*Otiocerus*). Type locality: Japan (Sapporo).

分布:千島(国後島),北海道,本州,四国;韓国,中国,極東ロシア,台湾. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

Genus *Nesokaha* Muir, 1913

(Subgenus *Tempora* Matsumura, 1914)

boninensis (Matsumura, 1914) オガサワラハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 290 (*Tempora*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawara-shima).

分布:小笠原諸島. **Distribution:** Ogasawara Islands.

Genus *Pepleuca* Emeljanov, 1999

candida (Anufriev, 1968) シロタエハネビロウンカ(改称)

Anufriev, 1968, *Entomol. Obozr.*, **47**: 145 (*Heronax*). Type locality: Amur District.

分布:本州;極東ロシア. **Distribution:** Honshu; Russian Far East.

Genus *Rhotana* Walker, 1857

maculata Matsumura, 1914 ヨツモンハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 295 (*Rhotana*). Type locality: Formosa (Arisan).

分布:奄美(奄美大島,徳之島),沖縄(沖縄本島),八重山(石垣島,西表島);台湾,中国.

Distribution: Ryukyu Islands; Taiwan, China.

satsumana Matsumura, 1914 キスジハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 294 (*Rhotana*). Type locality: Kiushu (Kagoshima).

分布:本州,四国,九州,対馬;韓国,中国,極東ロシア. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East.

Genus *Robigus* Distant, 1911

flexuosus (Uhler, 1896) アカフハネビロウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 283 (*Otiocerus*). Type locality: Japan.

分布:千島(国後島),北海道,本州,四国,九州,対馬;韓国,中国,極東ロシア,台湾. **Distribution:** Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Russian Far East, Taiwan.

Genus *Saccharodite* Kirkaldy, 1907

coccinea (Matsumura, 1940)

Matsumura, 1940, *Ins. Mats.*, **15**: 47 (*Rhotana*). Type locality: Kotosho (Botel Tobago).

分布:八重山(西表島);台湾,フィリピン,中国,東洋区,ニューギニア. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Oriental Region, New Guinea.

kagoshimana (Matsumura, 1914) ウスベニハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 294 (*Rhotana*). Type locality: Kiushu (Kagoshima).

分布:本州,四国,九州,奄美(奄美大島,徳之島),沖縄(沖縄本島,久米島),宮古(宮古島),八重山(石垣島,西表島,与那国島);東洋区. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; Oriental Region.

Genus *Vekunta* Distant, 1906

malloti Matsumura, 1914 アカメガシワハネビロウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 288 (*Vekunta*). Type locality: Honshu (Kamakura, Kyoto, Harima), Shikoku (Matsuyama), Kiushu (Bujen, Kumamoto, Nagasaki, Satsuma), Formosa (Giochi, Taipin).
= *okadae* Muir, 1914, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **3**: 45 (*Vekunta*). Type locality: Japan; Kamakura, Okitsu.
分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 久米島), 慶良間(座間味島, 慶留間島, 阿嘉島, 屋嘉比島, 久場島), 八重山(石垣島, 竹富島, 小浜島, 西表島, 与那国島); 台湾, 中国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan, China.

Family Achilidae コガシラウンカ科

Genus *Akotropis* Matsumura, 1914

fumata Matsumura, 1914 ウスグロコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 270 (*Akotropis*). Type locality: Kiushu (Jono), Formosa (Koshun, Tansui, Ako, Shoka).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 喜界島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 台湾. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan.

Genus *Caristianus* Distant, 1916

japonicus Ishihara, 1954 セジロコガシラウンカ

Ishihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 24 (*Caristianus*). Type locality: Omogo Valley, Iyo, Shikoku.

分布: 本州, 四国, 九州; 中国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu; China.

Genus *Catonidia* Uhler, 1896

sobrina Uhler, 1896 ウチワコガシラウンカ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 282 (*Catonidia*). Type locality: Japan.

分布: 本州, 四国, 九州, 八重山(石垣島, 西表島); 中国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; China.

Genus *Cixidia* Fieber, 1866

okunii (Matsumura, 1914) オオクニコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 281 (*Helicoptera*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布: 北海道, 本州. **Distribution**: Hokkaido, Honshu.

shikokuana (Ishihara, 1954) シコクコガシラウンカ

Ishihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 25 (*Epirama*). Type locality: Kuroson, Tosa, Shikoku.

分布: 本州, 四国, 九州. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu.

Genus *Deferunda* Distant, 1912

rubrostigma (Matsumura, 1914) アカフコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 273 (*Okatropis*). Type locality: Honshu (Tokyo), Formosa (Hoppo, Wanri, Ako, Koshun).

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 久米島), 慶良間(座間味島, 慶留間島, 屋嘉比島, 久場島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 台湾. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan.

Genus *Errada* Walker, 1870

ibukisana (Matsumura, 1914) イブキコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 280 (*Rhotala*). Type locality: Honshu (Ibuki Berg bei Gifu).

分布:本州. **Distribution:** Honshu.

jozankeana (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 278 (*Rhotala*). Type locality: Hokkaido (Sapporo).

分布:北海道. **Distribution:** Hokkaido.

nawae (Matsumura, 1914) ナワコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 279 (*Rhotala*). Type locality: Honshu (Kamagadani bei Gifu).

分布:北海道, 本州, 四国, 沖縄(沖縄本島), 八重山(西表島); 韓国, 中国. **Distribution:** Hokkaido, Honshu, Shikoku, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China.

niisimae (Matsumura, 1905) ニイジマコガシラウンカ

Matsumura, 1905, *Thous. Ins. Japan*, **2**: 62 (*Rhotala*). Type locality: Honshu (Kiyozumi).

分布:北海道, 本州. **Distribution:** Hokkaido, Honshu.

vittata (Matsumura, 1914) スジコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 280 (*Rhotala*). Type locality: Honshu (Gifu).

分布:本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East.

Genus **Kosalya** Distant, 1906

flavostrigata Distant, 1906

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhynch.*, **3**: 293 (*Kosalya*). Type locality: Burma, Ruby Mines.

分布:八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 中国, 極東ロシア, インド, ミャンマー. **Distribution:** Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Russian Far East, India, Myanmar.

Genus **Plectoderoides** Matsumura, 1914

nigrifrons Y. Hori, 1968 カオグロコガシラウンカ

Hori, 1968, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **10**: 16 (*Plectoderoides*). Type locality: Kosugi-dani, Is. Yaku-shima.

分布:大隅(屋久島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

vittifrons Ishihara, 1954 カオモンコガシラウンカ

Ishihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 26 (*Plectoderoides*). Type locality: Sutaru-toge (Amami-Oshima).

分布:奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

Genus **Tangina** Melichar, 1903

bipunctata Melichar, 1903 ニセメコガシラウンカ

Melichar, 1903, *Homopteren-Fauna von Ceylon*: 44 (*Tangina*). Type locality: Peradeniya.

分布:本州, 九州, 沖縄(沖縄本島), 八重山(西表島); ベトナム, スリランカ. **Distribution:** Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands; Vietnam, Sri Lanka.

Genus **Usana** Distant, 1906

yanonis Matsumura, 1914 シマコガシラウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 276 (*Usana*). Type locality: Honshu (Harima), Kiushu (Jono) und Formosa (Kanshirei, Koshun).

分布:本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄(沖縄本島); 台湾. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan.

Family **Tettigometridae** アリヅカウンカ科Genus **Tettigometra** Latreille, 1804**bipunctata** Matsumura, 1900 アリヅカウンカMatsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 210 (*Tettigometra*). Type locality: Japan.分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア, モンゴル. **Distribution**: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East, Mongolia.**shikokuana** Ishihara, 1954 シコクアリヅカウンカIshihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 17 (*Tettigometra*). Type locality: Omogo Valley, Iyo, Shikoku.分布: 四国. **Distribution**: Shikoku.Family **Caliscelidae** アカジマウンカ科Genus **Gelastissus** Kirkaldy, 1906**hokutonis** (Matsumura, 1916) ホクトセダカウンカMatsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 90 (*Conocaliscelis*). Type locality: Formosa (Hokuto).分布: 沖縄(沖縄本島, 粟国島), 慶良間(阿嘉島), 八重山(石垣島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.Genus **Ommatidiotus** Spinola, 1839**dissimilis** (Fallén, 1806) キタアカジマウンカFallén, 1806, *Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl.*, **27**: 123 (*Issus*). Type locality: Westrogothia (Sverige).分布: 北海道; シベリア, アルタイ, カザフスタン, 旧北区. **Distribution**: Hokkaido; Siberia, Altai, Kazakhstan, Palaearctic Region.**japonicus** Y. Hori, 1977 ニホンアカジマウンカHori, 1977, *Annot. zool. Japon.*, **50**: 127 (*Ommatidiotus*). Type locality: Ohmori, Moriyama-ku, Nagoya, Aichi Pref.分布: 本州(愛知県, 岐阜県); 中国. **Distribution**: Honshu; China.Family **Dictyopharidae** テングスケバ科Genus **Dictyophara** Germar, 1833**cummingsi** Distant, 1906Distant, 1906, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (7) **18**: 351 (*Dictyophara*). Type locality: Karachi.= *maculata* Matsumura, 1910, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **3**: 108 (*Dictyophora*!). Type locality: Tokyo (Nakano), Gifu, Maiko.分布: 本州; 韓国, 台湾, インド, 東洋区. **Distribution**: Honshu; Korean Peninsula, Taiwan, India, Oriental Region.**nakanonis** Matsumura, 1910 ナカノテングスケバMatsumura, 1910, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **3**: 109 (*Dictyophora*!). Type locality: Tokyo (Nakano).分布: 本州, 九州; 韓国, 中国, グアム, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, China, Guam, Oriental Region.**okinawensis** Matsumura, 1906 オキナワテングスケバMatsumura, 1906, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **1**: 31 (*Dictyophora*!). Type locality: Okinawa.分布: 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島, 慶留間島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島). **Distribution**: Ryukyu Islands.**patruelis** (Stål, 1859) テングスケバStål, 1859, *Kongl. Svenska Fregatten Eugenes*, **4**: 271 (*Pseudophana*). Type locality: Maracca.

= *tengi* Matsumura, 1905, *Thous. Ins. Jap.*, **2**: 56 (*Dictyophora*!). Type locality: 本州 “Honshu”. ヒメテングスケバ.
 = *sinica*: Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 207 (*Dictyophora*!) (not Walker, 1858). セスジテングスケバ.
 分布: 本州, 四国, 九州; 韓国, 中国, 台湾, アゼルバイジャン, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, China, Taiwan, Azerbaijan, Oriental Region.

Genus *Orthopagus* Uhler, 1896

lunulifer Uhler, 1896 ツマグロスケバ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 279 (*Orthopagus*). Type locality: Japan.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島); 韓国, 中国, 台湾. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan.

Genus *Saigona* Matsumura, 1910

ussuriensis (Lethierry, 1878) クロテングスケバ

Lethierry, 1878, *Compte Rendu Sci. Soc. entomol. Belg.*, **21**: 25 (*Almana*). Type locality: Maritime Territory.

= *ishidae* Matsumura, 1905, *Thous. Ins. Japan*, **2**: 55 (*Dictyophora*!). Type locality: 北海道, 本州(日光) “Hokkaido, Honshu (Nikko)”.

分布: 北海道, 本州; 韓国, 中国北東部, 極東ロシア. **Distribution**: Hokkaido, Honshu; Korean Peninsula, NE. China, Russian Far East.

Genus *Tenguella* Matsumura, 1910

mitsuhashii Matsumura, 1910 ミツハシテングスケバ

Matsumura, 1910, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **3**: 104 (*Tenguella*). Type locality: Kawasaki, Kumamoto, Tateyama.

分布: 本州, 九州. **Distribution**: Honshu, Kyushu.

Family Tropicuchidae グンバイウンカ科

Genus *Catullia* Stål, 1870

vittata Matsumura, 1914 タテスジグンバイウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 266 (*Catullia*). Type locality: Honshu (Gifu), Kyushu (Kumamoto).

分布: 本州, 九州, 対馬; 韓国, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Oriental Region.

Genus *Catullioies* Bierman, 1910

albosignatus (Distant, 1906) ツマグロシユロウンカ

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhynch.*, **3**: 284 (*Baruna*). Type locality: Ceylon; Tangalla.

分布: 八重山(西表島, 与那国島); 台湾, フィリピン, インドネシア. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Indonesia.

Genus *Cixiopsis* Matsumura, 1900

punctata Matsumura, 1900 ヒシウンカモドキ

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 208 (*Cixiopsis*). Type locality: Japan.

分布: 千島(国後島), 北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 極東ロシア, ベトナム, インド, スリランカ. **Distribution**: Chishima Islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Russian Far East, Vietnam, India, Sri Lanka.

Genus *Kallitaxila* Kirkaldy, 1901

auster Fennah, 1971

Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 600 (*Kallitaxila*). Type locality: Southwest Bay, Ani Jima, Chichi Jima group, Bonin Is.

= *auster murcia* Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 601 (*Kallitaxila*). Type locality: Camp Beach, Omura, Chichi Jima (Bonin Is.).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

boninensis (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 264 (*Tambinia*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

crini (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 264 (*Tambinia*). Type locality: Bonin-Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

sinica (Walker, 1851) ミドリゲンバイウンカ

Walker, 1851, *List Hom. Ins. Brit. Mus.*, **2**: 327 (*Monopsis*). Type locality: Hong Kong.

分布: 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 中国, 台湾. **Distribution**: Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; China, Taiwan.

suturalis (Matsumura, 1914)

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 265 (*Taxila*). Type locality: Bonin-Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

Genus ***Mesepora*** Matsumura, 1914

boninensis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 263 (*Mesepora*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

issiformis Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 263 (*Mesepora*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

ogasawarana Matsumura, 1914

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 263 (*Mesepora*). Type locality: Bonin Insel (Ogasawara-shima).

分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.

onukii (Matsumura, 1905) オヌキゲンバイウンカ

Matsumura, 1905, *Thous. Ins. Jap.*, **2**: 59 (*Epura*). Type locality: 本州, 九州 (Honshu, Kyushu). グンバイウンカ.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島, 慶留間島, 屋嘉比島, 久場島), 宮古(宮古島, 来間島), 八重山(石垣島, 西表島, 波照間島); 台湾, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region.

Genus ***Neommatissus*** Muir, 1913

basifuscus (Kato, 1933) コガシラゲンバイウンカ (ネグロコガシラゲンバイウンカ)

Kato, 1933, *Entomol. World*, **1**: 470 (*Stacotoides*). Type locality: Mt. Taiko, Formosa.

分布: 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus ***Ommatissus*** Fieber, 1875

lofouensis Muir, 1913 トビイロゲンバイウンカ

Muir, 1913, *Proc. Haw. entomol. Soc.*, **2**: 267 (*Ommatissus*). Type locality: Lo-fou Mountains, South China; 3500 feet elevation.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, Taiwan, China, Oriental Region.

Genus *Ossoides* Bierman, 1910*lineatus* Bierman, 1910 ヒラタゲンバイウンカ

Bierman, 1910, *Notes Leyden Mus.*, **33**: 27 (*Ossoides*). Type locality: Semarang, Java.

= *quadrivittata* Matsumura, 1913, *Thous. Ins. Jap. Addit.*, **1**: 59 (*Platyepora*). Type locality: Japan.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島, 慶留間島, 屋嘉比島, 久場島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 韓国, 中国, 台湾, ベトナム, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan, Vietnam, Oriental Region.

Genus *Sogana* Matsumura, 1914*hopponis* Matsumura, 1914 ツマグログンバイウンカ

Matsumura, 1914, *Ann. Mus. natl. Hung.*, **12**: 268 (*Sogana*). Type locality: Formosa (Shoka, Hoppo).

分布: 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Trypetimorpha* A. Costa, 1862*japonica* Ishihara, 1954 ハウチワウンカ

Ishihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 18 (*Trypetimorpha*). Type locality: Kashibara, Tanba, Honshu.

= *japonicus* Fennah, 1955, *Proc. biol. Soc. Wash.*, **68**: 125 (*Trichoduchus*). Type locality: Japan: Honshu, Kyoto.

分布: 本州, 九州; 韓国, 中国, 台湾. **Distribution**: Honshu, Kyushu; Korean Peninsula, China, Taiwan.

biermani (Dammerman, 1910) タイワンハウチワウンカ

Dammerman, 1910, in Bierman, *Notes Leyden Mus.*, **33**: 29 (*Trichoduchus*). Type locality: Semarang, Java.

= *formosana* Ishihara, 1954, *Sci. Rept. Matsuyama agr. Col.*, (14): 19 (*Trypetimorpha*). Type locality: Sozan near Taihoku, Formosa.

分布: 九州, 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(阿嘉島, 慶留間島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 中国, 台湾, フィリピン, マレーシア, インド.

Distribution: Kyushu, Ryukyu Islands; China, Taiwan, Philippines, Malaysia, India.

Family Issidae マルウンカ科

Subfamily Issinae クサビウンカ亜科

Genus *Eusarima* Yang, 1994*satsumana* (Matsumura, 1916) サツマクサビウンカ

Matsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 111 (*Sarima satsumanum*). Type locality: Kiushu (Satsuma).

= *yohenai* Matsumura, 1936, *Ins. Mats.*, **10**: 82 (*Sarima*). Type locality: Okinawa, Shuri.

分布: 九州, トカラ列島, 奄美(奄美大島, 徳之島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味島, 慶留間島, 阿嘉島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島). **Distribution**: Kyushu, Ryukyu Islands.

Genus *Issus* Fabricius, 1803*harimensis* Matsumura, 1913 カタビロクサビウンカ

Matsumura, 1913, *Thous. Ins. Jap. Addit.*, **1**: 61 (*Issus*). Type locality: Honshu (Harima and Kyoto).

分布: 本州, 四国, 九州. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu.

Genus *Neokodaiana* Yang, 1994*yaeyamana* Gnezdilov et M. Hayashi, 2015

Gnezdilov & Hayashi, 2015, *Jpn. J. syst. Entomol.*, **21**: 331 (*Neokodaiana*). Type locality: Ryukyus, Iriomote Is., Ôtomi.

分布: 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島). **Distribution**: Ryukyu Islands.

Genus *Sarima* Melichar, 1903

amagisana Melichar, 1906 クサビウンカ

Melichar, 1906, *Abh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, **3**: 303 (*Sarima*). Type locality: Sumatra, Pangherang-Pisang; (Japan) Nishidate, Hinga (=Hiuga), Kiushiu.

分布:本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 徳之島); 韓国, スマトラ, ジャワ島. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Sumatra, Java.

Genus *Sinesarima* Yang, 1994

ryukyuana (Y. Hori, 1970) リュウキュウクサビウンカ

Hori, 1970, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **10**: 82 (*Sarima*). Type locality: Foot of Mt. Inokawa, Tokunoshima I., Amami Is.

分布:奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 久米島), 慶良間(阿嘉島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

Subfamily **Hemisphaeriinae** マルウンカ亜科

Genus *Gergithoides* Schumacher, 1915

carinatifrons Schumacher, 1915 ダルマウンカ

Schumacher, 1915, *Mitt. zool. Mus. Berlin*, **8**: 126 (*Gergithoides*). Type locality: Hoozan, Polisha.

分布:四国, 九州, 対馬, 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島), 大東(北大東島, 南大東島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 東洋区. **Distribution:** Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region.

Genus *Gergithus* Stål, 1870

iguchii Matsumura, 1916 キボシマルウンカ

Matsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 98 (*Igushii!*). Type locality: Honshu (Harima).

分布:本州, 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 東洋区. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Oriental Region.

okinawanus Matsumura, 1936 オキナワマルウンカ

Matsumura, 1936, *Ins. Mats.*, **10**: 82 (*Gergithus*). Type locality: Okinawa, Shuri.

分布:沖縄(沖縄本島, 伊平屋島, 久米島, 渡名喜島), 慶良間(渡嘉敷島, 阿嘉島, 屋嘉比島), 大東(南大東島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

satsumensis Matsumura, 1916 サツママルウンカ

Matsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 101 (*Hemisphaerius*). Type locality: Kiushu (Kagoshima), Okinawa (Riukiu).

分布:九州, トカラ(宝島), 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島). **Distribution:** Kyushu, Ryukyu Islands.

variabilis (Butler, 1875) マルウンカ

Butler, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (4) **16**: 98 (*Gergithus*). Type locality: Japan.

= *carbonarius* Melichar, 1906, *Abh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, **3**: 65 (*Gergithus*). Type locality: Yokohama.

= *variabilis* var. *unicolor* Melichar, 1906, *Abh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, **3**: 66 (*Gergithus*). Type locality: Japan.

分布:本州, 伊豆(八丈島), 四国, 九州, 対馬; 韓国, 中国, 台湾, 東洋区. **Distribution:** Honshu, Izu Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island; Korean Peninsula, China, Taiwan, Oriental Region.

yayeyamensis Y. Hori, 1969 ヤエヤママルウンカ

Hori, 1969, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **10**: 55 (*Gergithus*). Type locality: Takeda, Ishigaki I.

分布:八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan.

Genus *Hemisphaerius* Schaum, 1850

kotoshonis Matsumura, 1938 サキシマベニスジマルウンカ (新称)

Matsumura, 1938, *Ins. Mats.*, **12**: 151 (*Hemisphaerius*). Type locality: Formosa (Kotosho).

= *takagii* Y. Hori, 1969, *Trans. Shikoku entomol. Soc.*, **10**: 61 (*Hemisphaerius*). Type locality: Sonai~Shirahama, Iriomote I.

分布:宮古(宮古島), 八重山(西表島); 台湾. **Distribution:** Ryukyu Islands; Taiwan.

Family Flatidae アオバハゴロモ科

Genus *Atracis* Stål, 1866*formosana* Jacobi, 1915 キノカワハゴロモJacobi, 1915, *Deutsch. entomol. Z.*, **1915**: 177 (*Atracis*). Type locality: Formosa: Takao, Fuhosho.分布: 本州, 九州, 奄美(奄美大島, 徳之島, 沖永良部島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 台湾. **Distribution**: Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan.Genus *Carthaeomorpha* Melichar, 1901*olivacea* (Matsumura, 1900)Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 213 (*Benna*). Type locality: Japan.分布: 小笠原諸島. **Distribution**: Ogasawara Islands.Genus *Geisha* Kirkaldy, 1900*distinctissima* (Walker, 1858) アオバハゴロモWalker, 1858, *List Hom. Brit. Mus., Suppl.*: 114 (*Poeciloptera*). Type locality: North China.分布: 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島, 口永良部島), 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味島, 慶留間島, 阿嘉島), 大東(北大東島, 南大東島), 宮古(宮古島, 来間島), 八重山(石垣島, 竹富島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 韓国, 中国, 台湾, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan, Oriental Region.Genus *Mimophantia* Matsumura, 1900*maritima* Matsumura, 1900 トビイロハゴロモMatsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 212 (*Mimophantia*). Type locality: Japan (Akashi, Kobe).分布: 本州, 小笠原諸島, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味島, 阿嘉島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 台湾, 中国, ミクロネシア, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, Taiwan, China, Micronesia, Oriental Region.

Family Nogodinidae ハゴロモモドキ科

Genus *Lollius* Stål, 1866*kuroiwae* (Matsumura, 1916) クロイワオオクサビウンカMatsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 106 (*Okissus*). Type locality: Okinawa (Riukiu).分布: 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島). **Distribution**: Ryukyu Islands.Genus *Mindura* Stål, 1862*subfasciata* Stål, 1870 モンハゴロモモドキStål, 1870, *Öfvers. Kongl. Vet.-Akad. Förh.*, **27**: 770 (*Mindura*). Type locality: Philippines.分布: 奄美(沖永良部島, 与論島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, フィリピン, スラウェシ, モルッカ諸島. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, Philippines, Sulawesi, Moluccas.*sundana* Kirkaldy, 1909 オキナワハゴロモモドキKirkaldy, 1909, *Can. Entomol.*, **41**: 32 (*Mindura*). Replacement name for *Mindura fuscata sensu* Melichar, 1898.= *fuscata*: Melichar, 1898, *Ann. K.-K. naturhist. Hofmus. Wien*, **13**: 301 (*Mindura*) (not Fabricius, 1794).

Recorded from Java.

= *guttifrons*: Matsumura, 1906, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **1**: 18 (*Nogodina*) (not Walker, 1870).

分布:奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 慶良間(阿嘉島, 久場島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); ジャワ島. **Distribution:** Ryukyu Islands; Java.

Genus *Pisacha* Distant, 1906*naga* Distant, 1906 スカシハゴロモモドキ

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhynch.*, **3**: 392 (*Pisacha*). Type locality: Assam; Naga Hills.

分布:本州, 四国, 対馬, 奄美(奄美大島, 徳之島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 中国, 台湾, ミャンマー, インド. **Distribution:** Honshu, Shikoku, Tsushima Island, Ryukyu Islands; China, Taiwan, Myanmar, India.

Genus *Tonga* Kirkaldy, 1900*yayeyamana* Matsumura, 1916 ヤエヤマエボシハゴロモ

Matsumura, 1916, *Trans. Sapporo nat. Hist. Soc.*, **6**: 108 (*Tonga*). Type locality: Okinawa (Yayeyama-Insel).

分布:沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島). **Distribution:** Ryukyu Islands.

Family Ricaniidae ハゴロモ科

Genus *Euricania* Melichar, 1898*facialis* (Walker, 1858) スケバハゴロモ

Walker, 1858, *List Hom. Ins. Brit. Mus.*, Suppl.: 100 (*Flatoides*). Type locality: North China.

分布:本州, 小笠原諸島, 四国, 九州; 韓国, 中国, 台湾, 東洋区. **Distribution:** Honshu, Ogasawara Islands, Shikoku, Kyushu; Korean Peninsula, China, Taiwan, Oriental Region.

ocellus (Walker, 1851) ヒトツメハゴロモ

Walker, 1851, *List Hom. Ins. Brit. Mus.*, **2**: 429 (*Pochazia*). Type locality: China.

分布:奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島); 中国, 台湾, 東洋区. **Distribution:** Ryukyu Islands; China, Taiwan, Oriental Region.

Genus *Orosanga* Fennah, 1971*dido* Fennah, 1971

Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 607 (*Orosanga*). Type locality: 'Bull Beach', Sakai-ura, Chichi Jima (Bonin Is.).

分布:小笠原諸島. **Distribution:** Ogasawara Islands.

japonicus (Melichar, 1898) ベッコウハゴロモ

Melichar, 1898, *Ann. K.-K. naturhist. Hofmus. Wien*, **13**: 224 (*Ricania*). Type locality: Japan.

= *japonica* var. *pallidula* Matsumura, 1932, *Conspectus Jpn. Inj. Ins.*: 232 (*Ricania*). Type locality: Japan.

分布:本州, 四国, 九州, 対馬, 大隅(屋久島, 口永良部島), 奄美(徳之島), 沖縄(沖縄本島), 八重山(石垣島); 韓国, 中国(南部), 台湾, 東洋区, ジョージア(グルジア). **Distribution:** Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, S. China, Taiwan, Oriental Region, Georgia.

laverna Fennah, 1971

Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 608 (*Orosanga*). Type locality: Ototo Jima, Kammuri-Iwa, Southwest Bay (Bonin Is.).

= *laverna vicinalis* Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 609 (*Orosanga*). Type locality: Camp Beach, Omura, Chichi Jima (Bonin Is.).

分布:小笠原諸島. **Distribution:** Ogasawara Islands.

triton Fennah, 1971

Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 606 (*Orosanga*). Type locality: Yoake Yama, Chichi Jima, Bonon Is.

分布:小笠原諸島. **Distribution:** Ogasawara Islands.

xantho Fennah, 1971

Fennah, 1971, *Ins. Micronesia*, **6**: 605 (*Orosanga*). Type locality: Bull Beach, Sakai-ura, Chichi Jima (Bonin Is.).

分布:小笠原諸島. **Distribution:** Ogasawara Islands.

Genus *Pochazia* Amyot et Audinet-Serville, 1843*albomaculata* (Uhler, 1896) アミガサハゴロモ

Uhler, 1896, *Proc. U. S. natl. Mus.*, **19**: 277 (*Ricania*). Type locality: Japan.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 沖縄(沖縄本島); 韓国. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula.

confusa Distant, 1906

Distant, 1906, *Faun. Brit. Ind. Rhyuch.*, **3**: 371 (*Pochazia*). Type locality: Assam (Margherita), Burma (Karen Hills), Japan.

= *interrupta*: Melichar, 1898, *Ann. K.-K. naturhist. Hofmus. Wien*, **13**: 210 (*Pochazia*) (not Walker, 1851).

分布: 日本; 東洋区. **Distribution**: Japan; Oriental Region.

Genus *Ricania* Germar, 1818*binotata* Walker, 1870 フタホシハゴロモ

Walker, 1870, *J. Proc. Linn. Soc. London*, **10**: 149 (*Ricania*). Type locality: New Guinea.

分布: 奄美(奄美大島), 沖縄(沖縄本島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島); 台湾, 東洋区.

Distribution: Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region.

pipera Distant, 1914 シロテンウスバハゴロモ

Distant, 1914, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (8) **13**: 420 (*Ricania*). Type locality: Malabar Dist., Taliparansbas.

= *formosana* Esaki, 1931, *Annot. zool. Japon.*, **13**: 268 (*Ricania*). Type locality: Urai (Hinoki-yama), N. Formosa.

分布: 八重山(西表島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution**: Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

quadrifasciata Kato, 1933 オオシラホシハゴロモ

Kato, 1933, *Entomol. World*, **1**: 467 (*Ricania*). Type locality: Shinchiku, Formosa.

分布: 本州(兵庫県); 台湾, 中国. **Distribution**: Honshu; Taiwan, China.

taeniata Stål, 1870 ヒメベッコウハゴロモ

Stål, 1870, *Öfvers. Kongl. Vet.-Akad. Förh.*, **27**: 766 (*Ricania*). Type locality: Philippines.

分布: 本州, 四国, 九州, 対馬, 奄美(徳之島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 与那国島); 韓国, 中国, 台湾, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan, Oriental Region.

Distribution: Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island, Ryukyu Islands; Korean Peninsula, China, Taiwan, Oriental Region.

trifasciata Matsumura, 1900

Matsumura, 1900, *Entomol. Nachr.*, **26**: 211 (*Ricania*). Type locality: Japan (Himedji, Hiroshima, Shimane).

分布: 本州. **Distribution**: Honshu.

Genus *Ricanoides* Zia, 1935*flabellum* (Noualhier, 1896) ウスバハゴロモ

Noualhier, 1896, *Bull. Mus. Hist. nat. Paris*, **2**: 256 (*Ricania*). Type locality: Cambodge.

分布: 小笠原諸島, 八重山(石垣島); 台湾, 中国, 東洋区. **Distribution**: Ogasawara Islands, Ryukyu Islands; Taiwan, China, Oriental Region.

Family Lophopidae アシブトウンカ科

Genus *Lophops* Spinola, 1839*carinata* (Kirby, 1891) マエジマアシブトウンカ

Kirby, 1891, *Zool. J. Linn. Soc. London*, **24**: 140 (*Brixioides*). Type locality: Pundaloya (Ceylon).

分布: 本州, 四国, 九州, 大隅(屋久島), 奄美(奄美大島, 喜界島, 徳之島, 与論島), 沖縄(沖縄本島, 久米島), 慶良間(座間味島, 慶留間島, 屋嘉比島, 久場島), 大東(南大東島), 宮古(宮古島), 八重山(石垣島, 西表島, 波照間島, 与那国島); 台湾, 東洋区. **Distribution**: Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu Islands; Taiwan, Oriental Region.